

Μάννα στο αμπέλι (*Plasmopara viticola*)

Автор(и): Растителна защита
Дата: 08.05.2017 Брой: 5/2017



Ανάλογα με την ηλικία των φύλλων, ο περονόσπορος σχηματίζει δύο τύπους κηλίδων: ελαιώδεις και ψευδομορφικές. Στο κάτω τους μέρος σχηματίζεται λευκή σποριοφόρος επίστρωση. Σε σοβαρές επιθέσεις τα φύλλα ξεραίνονται και πέφτουν πρόωρα. Υπό ευνοϊκές συνθήκες (σχετική υγρασία αέρα άνω του 75%) εμφανίζονται χλωρωτικές κηλίδες στα ταξιανθία και στα τσαμπιά, πάνω στις οποίες σχηματίζεται επίσης λευκή σποριοφόρος επίστρωση. Όταν οι κηλίδες βρίσκονται στη βάση του τσαμπιού, ολόκληρο το τσάμπι ξεραίνεται. Η μόλυνση των ρόγων σταματά όταν, για οινοποιητικές ποικιλίες αμπελιού, φτάσουν στο μέγεθος ενός «αρακά», και για επιτραπέζιες ποικιλίες αμπελιού στο μέγεθος ενός «φασολιού».

Στρατηγική καταπολέμησης του εχθρού:

Η επεξεργασία πραγματοποιείται όταν εμφανίζονται ευνοϊκές συνθήκες για μόλυνση (θερμοκρασία αέρα άνω των 13°C και συχνές αλλά ελαφριές βροχοπτώσεις) και κατά το ευαίσθητο φαιολογικό στάδιο της αμπέλου «άνθιση» - «αρακάς».

Εγκεκριμένα προϊόντα προστασίας φυτών:

acrobate r – 0,25%; acrobate plus wg – 200 g/ha; axanit-cu wp – 0,25%; alial 80 wg - 75-330 g/ha; alfil wg - 0,075-0,33 kg/ha; alfil wp - 0,075-0,33 kg/ha; alfil duplo - 90-350 g/ha; amalin flo - 280 ml/ha; anthracol 70 wg – 0,15%; armetil m – 0,25%; armetil-s wp – 0,25%; banko 500 – 0,2%; bordeaux mix 20 wp – 0,5-0,6%; valbon - 180-200 / ha; verita wg – 0,2%; winker wg – 200 g/ha; vitene triplo r - 400 -450 g/ha; vitra 50 wp /cuprohy 50 wp – 0,15%; galben 8 m 65 – 0,25%; delan 700 wdg – 0,05%; dimix 500 sc - 34 ml/ha εφαρμοζόμενο σε δεξαμενή μείγματος με προϊόντα που περιέχουν φολπρέτ; dimix 500 sc - 30 ml/ha εφαρμοζόμενο σε δεξαμενή μείγματος με προϊόντα που περιέχουν μανκοζέμπ; ditan dg - 200 g/ha; ditan m-45 - 200 g/ha; drago 76 wp – 0,16%; enervin – 0,2%; cabrio top – 0,15%- διάστημα επεξεργασίας 7-10 ημέρες - 0,2% κάθε 10-14 ημέρες; katanga express - 75-330 g/ha; katanga man - 300-500 g/100 l νερού; corseit r df – 0,25%; corseit r wp – 0,25% έως 09.2017; corseit max wp – 0,15%; cuadris 25 sc – 0,075%; cupertine m – 0,3%; cuproxat fl / tribase flowable – 0,3% έως 06.2017; cuproset gold m – 0,15%; cuprocin super m – 0,2%; lieto - 40-45 g/ha; mancozeb 80 wp – 0,3%; manfil 80 wp - 200 g/ha; manfil 75 wg - 210 g/ha; medeiro 80 wg- 75-330 g/ha; οξυχλωριούχος χαλκός 50 wp – 0,25%; medyan extra 350 sc - 350 ml/ha; melody compact 49 wg - 150 -175 g/ha έως 06.2017; mical flash – 0,3%; mildicut - 350-450 ml/ha; moximat 505 wg - 240-300 g/ha; moximat 505 wp - 240 – 300 g/ha; momentum extra wg - 300 g/ha; pasodoble 70 wg - 200 g/ha; pencozeb 80 wp - 200 g/ha; pencozeb 75 wg - 210 g/ha; pergado copper 27 wg - 500 g/ha; pergado f 45 wg – 0,2%; profiler 71.1 wg- 200-225 g/ha; ridomil gold mz 68 wg – 0,25%; rumba 35 sc – 0,35%; sancozeb 80 wp - 200 g/ha; sinstar - 70-80 ml/ha; solofol - 188 g/ha; strobilurin df /discus df - 0,015 %+acrobate mz - 0,15 %; sphinx extra /vinostar - 180 g/ha; folder 80 wg - 150 g/ha; follow 80 wg/ friller 80 wg/ flowet 80 wg - 187,5 g/ha; folpan 80 wdg - 0,15 % - 0,1 %+ardent 50 sc - 0,015 %; funguran oh 50 wp – 0,15%; shavit f 72 wdg – 0,2%; champion wp/ makk 50 wp /champ wp – 0,155.