

# Πρακτικές προστασίας των φυτών τον Ιούνιο για τα αμπέλια

Автор(и): гл.експерт Татьяна Величкова, Дирекция "Оценка на риска по хранителната верига", ЦОРХВ

Дата: 13.06.2017 Број: 6/2017



Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι αμπέλες βρίσκονται από τη φαινολογική φάση της «πλήρους άνθησης» έως τη φαινολογική φάση του «καρπού σε μέγεθος μπιζελιού» - «κλείσιμο τσαμπιού»

## Κύριοι εχθροί για την περίοδο

Καθαρμός του αμπελιού *Plasmopara viticola*

Ωίδιο *Oidium tuckeri*

## Φυκήρειο *Botrytis cinerea*

Σκώρος του αμπελιού *Lobesia botrana*

Ψείρα του αμπελιού *Pulvinaria vitis*

Κίτρινος αραχνίτης της άμπελου *Schizotetranychus viticola*

## Φυκήρειο

Στη φαινολογική φάση «πλήρους άνθησης», σχηματίζονται καφέ κηλίδες στα άνθη και στους μίσχους των ανθέων, οι οποίες καλύπτονται από τη σποριοποίηση του παθογόνου. Αυτά τα συμπτώματα είναι γνωστά ως πρόωρο φυκήρειο.

**Στρατηγική καταπολέμησης:** Σε βροχερό και ζεστό καιρό, αμέσως μετά την άνθηση, κατά την εμφάνιση των πρώτων μπιζελιών και στο κλείσιμο του τσαμπιού, πραγματοποιείται ψεκασμός με ένα από τα εγγεγραμμένα προϊόντα φυτοπροστασίας.

**Εγκεκριμένα προϊόντα φυτοπροστασίας:** arvak 50 WG - 100-150 g/ha; geox WG - 100 g/ha; driza WG - 100-150 g/ha; cabrio top – 0.2%; cantus - 100 g/ha; mevalon - 160-400 ml/ha; proletus 50 WG - 120 g/ha; rebut WG - 100-150 g/ha; sabueso - 100-150 g/ha; synpro - 150 ml/ha; switch 62.5 WG - 0.08%; thiram 80 WG – 0.4%; top plus 70 WP – 0.1%; topsin M 70 WDG – 0.1%; folder 80 WG - 150 g/ha; follow 80 WG / friller 80 WG / flowet 80 WG - 187.5 g/ha; folpan 80 WDG - 0.1 % + ardent 50 SC - 0.015 %; shavit F 72 WDG – 0.2%.

## Σκώρος του αμπελιού

Τον Ιούνιο πετούν τα πεταλούδες της δεύτερης γενιάς του εχθρού. Γεννούν τα αυγά τους σε μπιζέλια πρώτης ανάπτυξης. Οι κάμπιες προκαλούν ζημιά στα πρώτα μπιζέλια, ροκανίζοντας και τρώγοντας το εσωτερικό των μπιζελιών μαζί με τους σπόρους. Τα κατεστραμμένα μπιζέλια δεσμεύονται ασθενώς με μεταξωτά νήματα. Ένα κάμπι καταστρέφει από 7 έως 24 μπιζέλια.

**Στρατηγική καταπολέμησης:** Οι επεμβάσεις πρέπει να πραγματοποιούνται στο **Όριο Οικονομικής Βλαπτικότητας (ΟΟΒ):** για ποικιλίες επιτραπέζιας σταφυλιού 6-7 κάμπιες ανά 100 πρώτα μπιζέλια, και για ποικιλίες οινικής σταφυλιού 11-12 κάμπιες ανά 100 πρώτα μπιζέλια.

**Ευγκεκριμένα προϊόντα φυτοπροστασίας:** aficar 100 EC – 40 ml/ha; dascor 440 - 50 ml/ha; decis 100 EC - 12.5-17.5 ml/ha; dipel 2 X - 0.1 %; dukat 25 EC - 70 ml/ha; efcimetrin 10 EC / cyper 10 - 40 ml/ha; karate zeon 5 CS – 0.02%; coragen 20 SC - 18 ml/ha; luzindo 40 WG - 0.025 kg/ha; mageos - 10 g/ha; maltoato - 40-60 ml/ha; nexcid 015 CS - 0.03 %; nurelle D / chlorsirin 550 EC / samba - 60 ml/ha; runner 240 SC - 0.04 %; rapax - 75-100 ml/ha; reldan 40 EC - 0.12 %; sineis 480 SC - 4-18 ml/ha; sumi alpha 5 EC / sumicidin 5 EC - 0.025 %; forey 48 B - 0.15 %; fury 10 EC - 0.0125 %; ciklon 10 EC - 40 ml/ha; cyperfor 100 EC - 40 ml/ha; citrin max / cyperkyl 500 EC / cypert 500 EC / poli 500 EC - 6 ml/ha; sherpa 100 EW / aficar 100 / cyperfor 100 EW / ciklon 100 EW - 25 ml/ha; sherpa 100 EC - 40 ml/ha.