

Φροντίδα προστασίας φυτών τον Ιούλιο σε αμπελώνες

Автор(и): гл.експерт Татьяна Величкова, Дирекция "Оценка на риска по хранителната верига", ЦОРХВ

Дата: 06.07.2017 Број: 7/2017



Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι αμπελοι βρίσκονται στο φαινολογικό στάδιο από το «τέλος της άνθησης» έως την «αρχή της ωρίμανσης των ρώνγων» στις πρώιμες ποικιλίες.

Κύριοι εχθροί για την περίοδο

Καθαρός μίλδερος της αμπέλου *Plasmopara viticola*

Ερυσίβη της αμπέλου *Oidium tuckeri*

Γκρίζα σήψη *Botrytis cinerea*

Βακτηριδιακός καρκίνος *Agrobacterium vitis*

Σταφυλόσκολη *Lobesia botrana*

Αμπελοκόψη *Theresimima ampellophaga*

Αμπελοκόκκιδα *Pulvinaria vitis*

Κίτρινο αραχνάκι της αμπέλου *Schizotetranychus viticola*

Βακτηριδιακός καρκίνος

Σε μολυσμένα φυτά στα ξυλώδη μέρη, κοντά στην επιφάνεια του εδάφους ή αμέσως κάτω από αυτήν, παρατηρούνται διόγκωσεις (όγκοι). Τα άρρωστα φυτά παρουσιάζουν αναστολή ανάπτυξης, χλωρωτικά φύλλα και είναι εύκολο να υποστούν ζημιά από το κρύο τον χειμώνα.

Στρατηγική καταπολέμησης:

Τον Ιούλιο, οι αμπέλοι που εμφανίζουν συμπτώματα της ασθένειας πρέπει να σημειώνονται.

Αμπελοκόκκιδα

Η εκκόλαψη των προνυμφών συνεχίζεται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Προκαλούν ζημιά ρουφώντας χυμό από τα φύλλα, τους βλαστούς και τις σταφύλια. Γίνονται μια φορά έκδυση, τρέφονται για μια συγκεκριμένη περίοδο, στη συνέχεια εγκαταλείπουν τους τόπους τροφής και μετακινούνται στις θέσεις διαχείμασής τους. Ως αποτέλεσμα της ζημιάς, οι αμπέλοι αποδυναμώνονται.

Στρατηγική καταπολέμησης:

Η χημική καταπολέμηση πραγματοποιείται κατά των νεαρών προνυμφών.

Εγκεκριμένο προϊόν φυτοπροστασίας:

movento 100 sc - 0,075-0,095%;

