

Εβδομαδιαία αγρομετεωρολογική πρόγνωση για το τέλος Ιουλίου και τις αρχές Αυγούστου

Автор(и): Ρασιτιελνα ζασιτιτα
Дата: 29.07.2017 Број: 7/2017



Μέχρι το τέλος Ιουλίου και κατά τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου, η ανάπτυξη των γεωργικών καλλιεργειών θα προχωρήσει σε θερμοκρασίες κοντά στα κλιματικά κανονικά, και σε πολλά μέρη της χώρας – με βελτιωμένα αποθέματα υγρασίας του εδάφους.

Μετά τις καταιγίδες, το χαλάζι και οι καταρρακτώδεις βροχές (Ρούσε - 45 λ/μ², Σιλίστρα - 43 λ/μ² και Σούμεν - 33 λ/μ²) που έπεσαν κατά τις τελευταίες ημέρες της περασμένης περιόδου, αναμένεται σταθεροποίηση του καιρού και αλλαγή των αγρομετεωρολογικών συνθηκών στην επόμενη περίοδο. Το χαλάζι που έπεσε σε πολλά σημεία

της Βόρειας Βουλγαρίας (Βράτσα, Πόλσκι Τράμπες, Τρογιάν, Ρούσε, Τσάρεβ Μπροντ) για άλλη μια φορά δεν δίχασε τις γεωργικές καλλιεργείες. Έχουν προκληθεί ζημιές σε μέρος των μη συγκομισμένων στάχυων σιταριού (ξάπλωμα των καλλιεργειών, θρυμματισμός των στάχυων), καθώς και σε ανοιξιάτικες καλλιέργειες, λαχανικά και οπωροφόρα δέντρα.

Στην αρχή της επόμενης περιόδου, στην πρώτη ευκαιρία, οι καλλιέργειες λαχανικών, τα οπωροφόρα δέντρα και οι αμπέλια που επηρεάστηκαν από το χαλάζι, θα πρέπει κατά προτίμηση να αντιμετωπιστούν με μυκητοκτόνα που περιέχουν χαλκό, προκειμένου να επιταχυνθεί η επούλωση των τραυμάτων και να μειωθούν οι δευτερογενείς μολύνσεις από παθογόνους (γκρίζα σήψη στα κλήματα, ύστερη καφέ σήψη στους καρπούς των οπωροφόρων δέντρων, καθυστερημένη ερυσίβη της πατάτας και Αλτερναρία στις ντομάτες).

Μέχρι το τέλος Ιουλίου και κατά τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου, η ανάπτυξη των γεωργικών καλλιεργειών θα προχωρήσει σε θερμοκρασίες κοντά στα κλιματικά κανονικά, και σε πολλά μέρη της χώρας – με βελτιωμένα αποθέματα υγρασίας του εδάφους. Κατά την περίοδο, στους πρώιμους υβριδικούς σπόρους καλαμποκιού, θα παρατηρηθεί το στάδιο της γαλακτώδους ωριμότητας και μια μετάβαση από γαλακτώδη σε κηρώδη ωριμότητα στις καλλιέργειες σε σημεία της Πεδιάδας του Δούναβη και στις νότιες περιοχές της χώρας. Στον ηλίανθο, θα πραγματοποιείται η πλήρωση των σπόρων. Στις αρχές Αυγούστου, μέρος των καλλιεργειών στη Νότια Βουλγαρία θα εισέλθει στην αρχή του σταδίου ωρίμανσης.

Κατά την περίοδο, η αυξημένη περιεκτικότητα σε υγρασία στα ανώτερα στρώματα του εδάφους θα καθυστερήσει σε ορισμένα σημεία την ολοκλήρωση της συγκομιδής του σιταριού.

Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας και Υδρολογίας - Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών (NIMH-BAS)