

# Ύστερη καφέ σήψη /*Monilia fructigena*/

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 30.07.2017 Брой: 7/2017



Κατά τους θερινούς μήνες, η επίπτωση της επίθεσης από το παθογόνο μειώνεται. Υπό ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της ασθένειας (αυξημένη υγρασία και μέτριες υψηλές θερμοκρασίες), εμφανίζονται καφέ κηλίδες στα φρούτα, οι οποίες επεκτείνονται και μπορεί να καλύψουν ολόκληρο το φρούτο. Οι κατεστραμμένοι ιστοί είναι καφέ, σαπισμένοι, με ομόκεντρους δακτυλίουσ καλυμμένους από κιτρινωπά-λευκά ή σταχτόγριζα θύσανοι που σποριοποιούνται. Σε χαμηλή υγρασία, ολόκληρο το φρούτο ζαρώνει και μουμιοποιείται.

## Στρατηγική καταπολέμησης του εχθρού

Η θεραπεία πραγματοποιείται υπό ευνοϊκές συνθήκες και με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας.

**Εγκεκριμένα προϊόντα προστασίας φυτών:**

**Difcor 250 SC - 20 ml/da, Captan 80 WG - 150-180 g/da, Luna Experience - 63-75 ml/da, Prolectus 50 WG - 80-120 g/da, Signum - 60-75 g/da, Systhane 20 EW - 12.5-30.0 ml/da, Systhane Ekosom EW - 65-200 ml/da, Chorus 50 WG - 0.045%.**