

Πρακτικές προστασίας των φυτών στα αμπέλια τον Αύγουστο

Автор(и): гл.експерт Татьяна Величкова, Дирекция "Оценка на риска по хранителната верига", ЦОРХВ

Дата: 28.08.2017 Број: 8/2017



Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι αμπέλες βρίσκονται στη φαινοφάση της «βερεζόν» έως την «ωρίμανση των ρώγων».

Κύριοι εχθροί για την περίοδο

Καθαρός μυκητιάσος της αμπέλου *Plasmopara viticola*

Ωιδίου *Oidium tuckeri*

Φυσαλλίδα *Botrytis cinerea*

Σκώρος της αμπέλου *Lobesia botrana*

Κίτρινο αραχνάκι της αμπέλου *Schizotetranychus viticola*

Σκώρος της αμπέλου

Τον Αύγουστο, μέχρι το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, συνεχίζεται η πτήση των πεταλούδων της τρίτης γενιάς του εχθρού. Οι κάμπιες αυτής της γενιάς προκαλούν ζημιά στα ωριμάζοντα και ήδη ώριμα ρώγα των σταφυλιών, δένοντάς τα με μεταξωτά νήματα. Ως αποτέλεσμα της ζημιάς, δημιουργούνται συνθήκες για την διείσδυση του παράγοντα της φυσαλλίδας.

Στρατηγική καταπολέμησης:

Επεμβάσεις σε **ΟΚΚ**: για επιτραπέζιες ποικιλίες 7-8 κάμπιες ανά 100 τσαμπιά σταφύλι, και για οινοποιήσιμες ποικιλίες 10-12 κάμπιες ανά 100 τσαμπιά σταφύλι.

Εγκεκριμένα προϊόντα φυτοπροστασίας:

aficar 100 EC – 40 ml/ha; daskor 440 - 50 ml/ha; decis 100 EC - 12.5-17.5 ml/ha; dipel 2 X - 0.1%; dukat 25 EC - 70 ml/ha; efcimetrin 10 EC/cyper 10 - 40 ml/ha; karate zeon 5 CS – 0.02%; coragen 20 SC - 18 ml/ha; luzindo 40 WG - 0.025 kg/ha; mageos - 10 g/ha; maltoato - 40-60 ml/ha; neksid 015 CS - 0.03%; nurelle D /hlorsirin 550 EC /sanmba - 60 ml/ha; raner 240 SC - 0.04%; rapax - 75-100 ml/ha; reldan 40 EC - 0.12%; sineis 480 SC - 4-18 ml/ha; sumi alpha 5 EC/sumicidin 5 EC - 0.025%; forey 48 B - 0.15%; fury 10 EC - 0.0125%; ciklon 10 EC - 40 ml/ha; ciperfor 100 EC - 40 ml/ha; citrin max /ciperkil 500 EC /cipert 500 EC /poli 500 EC - 6 ml/ha; sherpa 100 EW /aficar 100 /ciperfor 100 EW /ciklon 100 EW - 25 ml/ha; sherpa 100 EC - 40 ml/ha.

Κίτρινο αραχνάκι της αμπέλου

Τον Αύγουστο παρατηρούνται επικαλυπτόμενοι πληθυσμοί πολλών γενεών. Σε περίπτωση σοβαρής προσβολής, τα φύλλα των αμπελών παραμορφώνονται, γίνονται τραχιά και τρίζουν όταν συνθλίβονται. Θερμοκρασίες άνω των 32-35°C είναι θανατηφόρες για τους πληθυσμούς του αραχνάκιου. Κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, τα θηλυκά μετακινούνται κάτω από τον παλιό φλοιό των αμπελών για να διαχειμάσουν.

Стратηγική καταπολέμησης:

Η επέμβαση πραγματοποιείται κατά ενηλίκων και προνυμφών όταν επιτευχθεί ο **ΟΚΚ** - 9-10 άτομα/φύλλο - μέχρι το τέλος Αυγούστου.

Εγκεκριμένα προϊόντα φυτοπροστασίας:

apolo 50 SC - 30-40 ml/ha; envidor 240 SC - 40 ml/ha; masai WP - 25 g/ha; nisoran 5 EC - 0.05%; ortus 5 SC /danitron 5 SC - 0.05%; sanmite 20 WP - 0.05%.