

Σφήκα του φύλλου της ελαιοκράμβης – *Anthalia rosae*

Автор(и): Ρασιτιελνα ζασιτιτα
Дата: 08.10.2017 Брой: 10/2017



Ζημιά:

Το φθινόπωρο αναπτύσσεται μια τρίτη γενιά του εντόμου. Οι ενήλικες σφηκίδες πετούν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και ωτοκοούν στα κοτυλήδωνα και στα πρώτα αληθινά φύλλα. Οι νεαροί προνύμφες τρέφονται στο κάτω μέρος των φύλλων, τα τρυπώνοντας με τη μορφή μικρών κοιλαμάτων. Καθώς μεγαλώνουν, δαγκώνουν τρύπες στις λεπίδες των φύλλων, οι οποίες σταδιακά μεγεθύνονται,

προκαλούν περιφερειακή ζημιά από την τροφή και αργότερα καταναλώνουν ολόκληρη τη λεπίδα του φύλλου, αφήνοντας μόνο τις κύριες φλέβες. Μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξής τους, οι προνύμφες σκάβουν στο

έδαφος και παραμένουν εκεί για να διαχειμάσουν.

Καταπολέμηση:

Η καταπολέμηση του σφηκίδη της ελαιοκράμβης πραγματοποιείται σε οικονομικό κατώφλι 2–3 προνύμφες/m² ή 2–3 κατεστραμμένα φυτά/m².

Εγγεγραμμένα εντομοκτόνα για καταπολέμηση:

Karate Zeon 5 CS – 15

ml/da; Cytrin Max – 5 ml/da, Decis 100 EC - 6.3 ml/da, Dukat 25 EC - 20 ml/da, Pirinex Supreme 3W - 60 ml/da