

Ψύλλος του στελέχους της ελαιοκράμβης – Psylloides Chrysocephala

Автор(и): Ρастителна защита
Дата: 10.10.2017 Брой: 10/2017



Ζημιά:

Ο ψυλλόβρουχος της κράμβης είναι διαδεδομένος παντού και σε

υψηλή πυκνότητα πληθυσμού προκαλεί τεράστιες ζημιές. Το έντομο αναπτύσσει μία

γενιά ανά έτος. Διαχειμάζει ως αυγό, προνύμφη και ενήλικο έντομο.

Τον Σεπτέμβριο, τα ενήλικα αρχίζουν να τρέφονται εντατικά και από τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου γεννούν τα αυγά τους. Οι εκκολαφθείσες προνύμφες αρχικά σκάβουν στο επιδέρμιο των βλαστών, και αργότερα

στα μίσχια και στις κεντρικές φλέβες των φύλλων. Μέρος των προνυμφών εκκολάπτεται την άνοιξη.

Ένα συγγενικό είδος με τον ψυλλόβρουχο της κράμβης είναι ο Μικρός ψυλλόβρουχος της κράμβης. Άλλα επιβλαβή είδη στην ελαιοκράμβη είναι: ο μαύρος, ο ανοικτόποδος, ο κυματογραμμικός, ο της λιναριάς, ο της κάνναβης και άλλα είδη ψυλλόβρουχων.

Καταπολέμηση:

3 Η χημική καταπολέμηση εφαρμόζεται σε οικονομικό κατώφλι: 2 ενήλικα/τ.μ. κατά τη βλάστηση; 4 ενήλικα/τ.μ. μετά την εμφάνιση του 3ου φύλλου; 3–5 προνύμφες ανά φυτό.

Εγγεγραμμένα εντομοκτόνα για καταπολέμηση:

Mavrik 2 F – 30 ml/στρ; Citrin Max – 5 ml/στρ; Deka EC – 30 ml/στρ; Decis 100 EC – 5 ml/στρ; Dukat 25 EC – 30 ml/στρ; Mageos – 5 g/στρ; Nurelle D – 60 ml/στρ; Pirinex Supreme 3V – 60 ml/στρ; Sherpa 100 EW – 25 ml/στρ.