

Κατάλληλες συνθήκες για φύτευση οπωροφόρων δέντρων

Автор(и): Растителна защита
Дата: 29.11.2017 Брой: 11/2017



Μέχρι το τέλος του μήνα οι αγρομετεωρολογικές συνθήκες θα καθοριστούν από υπέρ το κανονικό θερμοκρασίες. Στις πεδινές περιοχές της χώρας, οι προβλεπόμενες τιμές των μέσων ημερήσιων θερμοκρασιών θα υπερβούν σημαντικά το βιολογικό ελάχιστο που απαιτείται για την ανάπτυξη του σιταριού, της κριθαριάς και του χειμερινού ελαιοκράμβη. Το αναμενόμενο ήπιο καιρό για την εποχή θα παρατείνει τη φθινοπωρινή βλάστηση των χειμερινών δημητριακών και του χειμερινού ελαιοκράμβη και θα αποτελέσει προϋπόθεση για πρόοδο στην ανάπτυξη των καθυστερημένων φυτειών του Νοεμβρίου.

Πτώση και διακοπή της βλάστησης στα φθινοπωρινά καλλιέργειες

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου προβλέπεται μείωση και κανονικοποίηση των θερμοκρασιακών συνθηκών, που θα οδηγήσει σε πτώση και, στα υψηλότερα χωράφια, σε διακοπή της βλάστησης των φθινοπωρινών καλλιεργειών. Στο τέλος της τρίτης δεκάμερας, το σιτάρι και η κριθαριά που σπάρθηκαν εντός των αγροτεχνικών προθεσμιών θα βρίσκονται κυρίως στο στάδιο του αχυρώνα. Το στάδιο του τρίτου φύλλου θα κυριαρχεί στις φυτειές που σπάρθηκαν στις αρχές Νοεμβρίου, και το στάδιο της εμφάνισης σε αυτές που σπάρθηκαν στα μέσα του μήνα. Σε μεγάλο μέρος των φυτειών ελαιοκράμβη θα παρατηρηθεί το στάδιο της ροζέτας (6–7 φύλλα). Σε ορισμένα σημεία των νοτιοανατολικών περιοχών (αγροτικός σταθμός Σλίβεν) το ύψος των φυτειών ελαιοκράμβη έχει φθάσει τα 25–27 cm, και η ροζέτα – 7–8 φύλλα.

Στο τέλος του μήνα θα υπάρξουν κατάλληλες συνθήκες για φύτευση οπωροφόρων δέντρων και για την εκτέλεση των φθινοπωρινών ψεκασμών φυτοπροστασίας στους οπωρώνες.

Πηγή: EEBA-BA