

Οι υψηλές θερμοκρασίες στα τέλη Δεκεμβρίου οδηγούν στην επαναφορά των βλαστικών διεργασιών στα φθινοπωρινά καλλιέργειες.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 29.12.2017 Брой: 12/2017



Ο ζεστός για την εποχή καιρός κατά την περασμένη επταήμερη περίοδο, με μέγιστες θερμοκρασίες που έφτασαν σε ορισμένες περιοχές έως και 17-18°C, οδήγησε στην επαναφορά των βλαστικών διαδικασιών σε φθινοπωρινές καλλιέργειες σε μερικές από τις πεδινές περιοχές της χώρας και προκάλεσε ανεπιθύμητο, πρόωρο прήξιμο των μπουμποκιών σε ορισμένα είδη δέντρων.

Κατά την επερχόμενη περίοδο, οι αγρομετεωρολογικές συνθήκες θα καθοριστούν από υψηλότερες από το κανονικό θερμοκρασίες, ωστόσο οι μέσες ημερήσιες τιμές τους δεν θα υπερβούν το απαιτούμενο βιολογικό ελάχιστο για τη βλάστηση των χειμερινών δημητριακών. Εξαιρέσεις θα παρατηρηθούν μόνο σε μεμονωμένες τοποθεσίες κατά μήκος της ακτής της Μαύρης Θάλασσας και στις νότιες περιοχές της χώρας.

Στις αρχές Ιανουαρίου, οι θερμοκρασίες θα υποστούν σημαντική αλλαγή. Η προβλεπόμενη ψύξη θα αποκαταστήσει την περίοδο αδράνειας στα χειμερινά δημητριακά. Στις αρχές του έτους, τα στάδια ανάπτυξης του σιταριού θα είναι κυρίως στο στάδιο του θάμνισης, και της ελαιοκράμβης στο στάδιο της ροζέτας – στάδια κατάλληλα για την διαχείριση.

Μέχρι τα μέσα της πρώτης δεκαήμερης περιόδου του Ιανουαρίου, δεν προβλέπονται κρίσιμες ελάχιστες θερμοκρασίες για τις γεωργικές καλλιέργειες.

Πηγή: EABE-BA