

Παρατεταμένη αύξηση της θερμοκρασίας στις αρχές Φεβρουαρίου

Автор(и): Растителна защита
Дата: 30.01.2018 Брой: 1/2018



Στο τέλος Ιανουαρίου, αρνητικές θερμοκρασίες στην κλίμακα των -13 έως -15°C καταγράφηκαν σε ορισμένα σημεία της Βόρειας Βουλγαρίας και των υψιπέδων: Σόφια, Ντράγκομαν, Κνέζα, Νικολάεβο, Σούμεν, Ντβε Μόγκιλι και Ισπέρικ. Αυτές οι τιμές είναι πάνω από τα κρίσιμα όρια για τις χειμερινές δημητριακές καλλιέργειες που διαχειμάζουν στο στάδιο της αχυροποίησης, αλλά υπό συνθήκες απουσίας ή άνισου και κηλιδωτού χιονοστρώματος και μακροβιότερης παραμονής, αυτές οι θερμοκρασίες είναι επικίνδυνες για τις καλλιέργειες που σταμάτησαν τη βλάστηση στο στάδιο του τρίτου φύλλου, ειδικά για τη κριθάρι.

Μετά τον παγετώδη καιρό στα μέσα της τρίτης δεκάδας του Ιανουαρίου, στις αρχές Φεβρουαρίου οι αγρομετεωρολογικές συνθήκες θα υποστούν αλλαγή. Στο τέλος του μήνα, αναμένεται αύξηση των

θερμοκρασιών, αλλά στα περισσότερα από τα ορεινά πεδία οι μέσες ημερήσιες τιμές τους θα παραμείνουν εντός ορίων που θα διατηρήσουν τις φθινοπωρινές σπορές σε κατάσταση αδράνειας. Εξαιρέσεις θα συμβούν στο βορειοδυτικό τμήμα της Πεδιάδας του Δούναβη και στις ακραίες νοτιοδυτικές περιοχές, όπου θα είναι κοντά στο βιολογικό ελάχιστο που απαιτείται για την επανάληψη των βλαστικών διαδικασιών στις χειμερινές δημητριακές καλλιέργειες.

Καμία βροχόπτωση δεν αναμένεται κατά την περίοδο και οι συνθήκες θα είναι κατάλληλες για την εκτέλεση κλάδευσης και ψεκασμού χειμερινής προστασίας φυτών σε οπωρώνες κατά των μορφών διαχείμασης μιας σειράς παθογόνων: μούχλασης των ανθών (πρώιμη καφέ σήψη), νόσου των τρυπητών κηλίδων, κύρτωσης φύλλων ροδακινιάς κ.λπ.

Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας και Υδρολογίας - Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών (EIMY-BAE)