

# Καμπυλότητα στο ροδάκινο

Автор(и): Ραυτιτελνα ζαυτιτα  
Дата: 12.02.2019 Брой: 2/2019



**Αιτιολογικός παράγοντας:** *Tafirina deformans* – μύκητας

**Φυτά-ξενιστές:** ροδάκινο, νεκταρίνι, βερίκοκο

## Συμπτώματα:

Μονά ή πολλαπλά, χλωρά πρασινωπά, χλωρά κιτρινωπά ή άλικο κόκκινα πρήξιμα στην επάνω πλευρά των φύλλων, τα οποία στην κάτω πλευρά είναι εσοχή. Οι ιστοί είναι πυκνοί, τραχείς και πτυχωμένοι με κυματιστό τρόπο.

Η βλάβη μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη τη φυλλική πλάκα, με αποτέλεσμα τα φύλλα να νεκρώνονται και να πέφτουν.

Στα μολυσμένα ιστού σχηματίζεται λευκωπός επίχρισμα.

Πρήξιμα μπορεί επίσης να σχηματιστούν στους βλαστούς και στους καρπούς.

## Κύκλος ζωής

Ο αιτιολογικός παράγοντας διαχειμάζει με τη μορφή ασκοσπορίων ανάμεσα στα λέπια των οφθαλμών ή στον φλοιό μολυσμένων βλαστών. Οι μολύνσεις συμβαίνουν νωρίς την άνοιξη, με τη διάρρηξη των φυλλικών οφθαλμών.

## Διαχείριση:

Ψεκασμοί φθινόπωρου-χειμώνα. Εάν ο φθινοπωρινός ψεκασμός έχει παραλειφθεί, η θεραπεία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι το πρήξιμο των οφθαλμών με 1% Μπορντέζικο γάλα, το οποίο είναι επίσης αποτελεσματικό κατά των αιτιολογικών παραγόντων της **άνθρωξης (πρώιμης καφέ σήψης) και της τρυπητής κηλίδας των πυρηνόκαρπων.**