

# Ώρα για ψεκασμό πριν την άνθηση

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 12.03.2018 Број: 3/2018



Στο τρίτο δεκαήμερο του Μαρτίου, ξεκινάει η ημερολογιακή άνοιξη. Η μέση μηνιαία θερμοκρασία ανεβαίνει από 4-8°C, η νεφελώδηση μειώνεται και ο αριθμός των ηλιόλουστων ημερών αυξάνεται. Ως αποτέλεσμα της θέρμανσης, τερματίζεται η φάση της εξαναγκασμένης αδράνειας των σπυροφόρων ειδών, και ταυτόχρονα ενεργοποιείται η ζωτική δραστηριότητα μιας σειράς εχθρών τους. Ο καιρός του Μαρτίου είναι πολύ μεταβλητός, γεγονός που απαιτεί από τους καλλιεργητές σπυροφόρων να παρακολουθούν για κατάλληλες ημέρες εργασιών στους καρποφόρους κήπους.

Πολλές από τις υπερχειμασμένες μορφές επικίνδυνων εχθρών των σπυροφόρων δέντρων περνούν το χειμώνα στο έδαφος, και στα πεσμένα φύλλα «καραδοκούν» οι παθογόνοι οργανισμοί των ασθενειών, έτοιμοι να επιτεθούν. Επομένως, καλλιεργημένοι και καθαροί καρποφόροι κήποι είναι μια εγγύηση για τη μείωση του

κινδύνου από εχθρούς. Εάν μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί χειμερινός ψεκασμός, δεν πρέπει να παραλειφθεί, γιατί καταστρέφει ακάρεα, αφίδες και ασπιδοειδή.

Οι προανθικοί ψεκασμοί ξεκινούν τον Μάρτιο. Ο πρώτος είναι στο στάδιο «ποντικού αυτιού» στη μηλιά – κατά της ασκομυκήτωσης και της κνημώδους τάφρου με μυκητοκτόνο, και ο δεύτερος – πάλι κατά των ίδιων ασθενειών, αλλά με τη συμπερίληψη εντομοκτόνου κατά της σφηκοφάγου της μηλιάς. Στη αχλαδιά – κατά της κνημώδους τάφρου, της σφηκοφάγου της αχλαδιάς, της ψύλλας της αχλαδιάς και της κοριδομάνας. Στη γλυκιά κερασιά και τη βουσσινιά – κατά της καφέ σήψης, της στικτότητας, του εμπυρισμού, του βρυχοφάγου της κερασιάς/βουσσινιάς. Δαμάσκηνα – σφηκοφάγος του δαμάσκηνου. Βερίκοκο – καφέ σήψη, στικτότητα, κλαδοβόρος του ροδακινιού. Ροδάκινο – κύρτωση φύλλων, κλαδοβόρος του ροδακινιού.

Οι προανθικοί ψεκασμοί των οπωροφόρων δέντρων είναι ένα υπεύθυνο μέτρο που δεν πρέπει να παραλειφθεί. Σηματοδοτούν την αρχή του χημικού ελέγχου, και αυτή η αρχή καθορίζει το φυτοϋγειονομικό status στον καρποφόρο κήπο καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.

*Για χημικό έλεγχο στον καρποφόρο κήπο και τον λαχανόκηπο – για τους χρόνους επεμβάσεων και τα κατάλληλα προϊόντα, διαβάστε το τεύχος 2/2018 του περιοδικού «Φυτοπροστασία».*