

# Κατάλληλες συνθήκες για ψεκασμό φυτοπροστασίας σε οπωρώνες

Автор(и): Ρастителна защита  
Дата: 09.04.2018 Број: 4/2018



Κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου, η ανάπτυξη των γεωργικών καλλιεργειών θα προχωρήσει σε επιταχυνόμενο ρυθμό, σε θερμοκρασίες πάνω από τα κλιματολογικά κανονικά. Κατά τη διάρκεια της περιόδου, στις πεδινές περιοχές, οι χειμερινοί δημητριακοί θα βρίσκονται στο στάδιο επιμήκυνσης του στελέχους. Στην ελαιοκράμβη, θα πραγματοποιηθεί ο σχηματισμός κλάδων και το στάδιο της μπουμπουκιάσματος.

Στα τέλη της πρώτης και στις αρχές της δεύτερης δεκαήμερης του Απριλίου, αναμένεται σταθεροποίηση των καιρικών συνθηκών και θα δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες για την εκτέλεση επειγόντων ψεκασμών φυτοπροστασίας σε οπωρώνες. Οι βροχοπτώσεις στην αρχή της άνοιξης αύξησαν την πίεση μόλυνσης από διάφορες μυκητιακές ασθένειες – μούχλανση των ανθών (πρόωρη καφέ σήψη), τρυπητή φυλλόρροια, κνησμό,

κ.λπ. Στην γλυκιά και την ξινή κερασιά, η μετα-άνθισης θεραπεία κατά μιας από τις πιο επικίνδυνες ασθένειες – της Κυλινδροσπορίωσης (λευκή σκουριά) δεν πρέπει να παραλειφθεί.

Επίσης κατά την επόμενη περίοδο, σε πολλά μέρη της χώρας η υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία στα ανώτερα στρώματα του εδάφους θα δυσκολέψει την εκτέλεση προ-σποράς καλλιεργητικών εργασιών και την καθυστερημένη σπορά των πρώιμων και μεσοπρόωρων ανοιξιότικων καλλιεργειών. Οι υπερκανονικές βροχοπτώσεις του Μαρτίου είναι ο λόγος για την απώλεια των αγροτεχνικών προθεσμιών σποράς του ηλιοτρόπιο σε ένα μεγάλο μέρος των πεδινών περιοχών της χώρας.

*Πηγή: ΕΜΥ*