

Δροσομύγα της κερασιάς (*Rhagoletis cerasi* L.)

Автор(и): Растителна защита
Дата: 22.05.2018 Брой: 5/2018



Αυτός είναι ο οικονομικά σημαντικότερος εχθρός της κερασιάς. Η πτήση των μυγών ξεκινά σε θερμοκρασία εδάφους περίπου 10°C. Η εμφάνιση συμπίπτει με την ωρίμανση των πρώιμων ποικιλιών κερασιών. Το έντομο τοποθετεί τα αυγά του σε καρπούς που έχουν αρχίσει να ωριμάζουν. Η ζημιά προκαλείται από τη προνύμφη, που τρέφεται με τη σαρκώδη μέρη του καρπού. Οι κατεστραμμένοι καρποί μαυρίζουν, σαπίζουν και κοιλαίνονται στο σημείο του τραυματισμού. Τα καρποί που έχουν προσβληθεί από σκουλήκια είναι ακατάλληλα για κατανάλωση.

Στρατηγική καταπολέμησης του εντόμου:

Για τον προσδιορισμό της καταλληλότερης χρονικής στιγμής για τον έλεγχο της μύγας της κερασιάς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυασμένες παγίδες, οι οποίες τοποθετούνται πριν από τη μόλυνση των πρώιμων ποικιλιών κερασιών. Ο έλεγχος της μύγας της κερασιάς κατευθύνεται κατά του ενήλικου εντόμου πριν από την ωοτοκία, για το οποίο είναι πολύ σημαντικό να διαπιστωθεί η έναρξη της πτήσης της μύγας, πράγμα που γίνεται με τη βοήθεια παγίδων.

Ο χημικός έλεγχος της μύγας της κερασιάς πραγματοποιείται κατά των ενηλίκων πριν από την τοποθέτηση των αυγών τους, περίπου 10–12 ημέρες μετά την έναρξη της πτήσης.

Εγκεκριμένα προϊόντα προστασίας φυτών:

Vaztak New 100 EC – 0,015%; Decis 2.5 EC – 0,03%; Decis 100 EC – 10–17,5 ml/da; Eforia 045 ZC – 150 ml/da; Calypso 480 SC – 0,02%; Karate Express WG /Ninja /Forza – 60–100 g/da; Karate Zeon 5 CS – 15 ml/da; Naturalis – 100–200 ml/da; Fury 10 EC – 0,0125%.