

Ανατολίκός σκώρος της ροδιάς (*Grapholitha Cydia molesta*)

Автор(и): Ραστίτελνα ζαχίτα
Дата: 20.06.2018 Брой: 6/2018



Τον Ιούλιο, πετούν τα πεταλούδες της δεύτερης γενιάς του εντόμου και γεννούν αυγά. Οι κάμπιες της τρίτης γενιάς προκαλούν ζημιά κυρίως στους καρπούς. Η κάμπια τρυπά πλευρικά, στα σημεία επαφής μεταξύ των καρπών ή κοντά στο μίσχο. Συχνά παρατηρείται γομμόζη. Οι κατεστραμμένοι καρποί παραμορφώνονται ή σαπίζουν. Εμφανίζουν σημάδια πρόωρης ωρίμανσης και πέφτουν.

Οι κάμπιες της ανατολικής καρποκόκκης προσβάλλονται από μεγάλο αριθμό παρασιτοειδών. Μεγαλύτερης σημασίας είναι ο βρακονίδης *Ascogaster quadridentatus* Wesm.

Стратηγική αντιμετώπισης του εντόμου:

Απαιτείται αυστηρός καραντινοϊατρικός έλεγχος προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της ανατολικής καρποκόκκης, με διεξαγωγή ετήσιων ελέγχων σε καλλιέργειες για την έγκαιρη ανίχνευσή της. Η έναρξη της πτήσης και η δυναμική της ανατολικής καρποκόκκης προσδιορίζονται με παγίδες φερομόνης.

Ο χημικός έλεγχος πραγματοποιείται στο **Όριο Οικονομικής Βλαπτικότητας (ΟΟΒ)**:

-κατά τη διάρκεια της περιόδου βλάστησης – 10-15 πεταλούδες ανά παγίδα ανά εβδομάδα.

-νεαρές καλλιέργειες – 2-3% μολυσμένοι βλαστοί από κάμπια.

-καρποφόρες καλλιέργειες - 5% κατεστραμμένοι βλαστοί ή 2-4% μολυσμένοι καρποί από κάμπια.

Εγκεκριμένα προϊόντα προστασίας φυτών:

avant 150 EC - 33.3 ml/da; vaztak nov 100 EC – 0.0125%; deca EC / desha EC/dena EC - 50 – 70 ml/da; decis 2.5 EC – 0.04%; dimilin 25 WP - 0.04%; dursban 4 EC - 150-200 ml/da; eforia 045 ZC - 150 ml/da; karate express WG /ninja /forza - 100-120 g/da; coragen 20 SC - 16 – 30 ml/da; luzindo 40 WG - 0.025 kg/da; madex twin - 10 ml/da; meteor - 90 ml/100 l νερού; runner 240 SC – 0.03%; rapax SBS europa - 100-200 ml/da; sumi alpha 5 EC/sumicidin 5 EC – 0.02%.