

Στα τέλη Αυγούστου και στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο καιρός είναι κατάλληλος για τη συγκομιδή ηλίανθου.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 31.08.2018 Брой: 8/2018



Κατά την επόμενη επταήμερη περίοδο (31.08-05.09.2018) η ανάπτυξη των όψιμων αγροτικών καλλιεργειών θα προχωρήσει με επιταχυμένο ρυθμό, υπό υπερκανονικές θερμικές συνθήκες. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, οι καλλιέργειες ηλίανθου στα υψηλότερα χωράφια θα ολοκληρώσουν επίσης την ανάπτυξή τους. Σε υβρίδια μέσης-όψιμης ωριμότητας καλαμποκιού, θα παρατηρηθεί ευρέως η κηρώδης και η πλήρης ωριμότητα, ενώ στα όψιμα υβρίδια – η γαλακτώδης ωριμότητα και η μετάβαση από τη γαλακτώδη στην κηρώδη ωριμότητα.

Στις αρχές της περιόδου, αναμένεται ξηρό καιρό στις πεδινές περιοχές της χώρας, παρέχοντας κατάλληλες συνθήκες για τη συγκομιδή του ηλίανθου και για το καθάρισμα των εκτάσεων που είχαν σπαρεί με νωρίτερα υβρίδια καλαμποκιού.

Κατά το δεύτερο μισό της περιόδου, οι αγρομετεωρολογικές συνθήκες θα υποστούν αλλαγή, πιο σημαντική στη Δυτική Βουλγαρία. Προβλέπονται βροχοπτώσεις και βελτίωση των υδατικών αποθεμάτων στα ανώτερα στρώματα του εδάφους, γεγονός που θα αποτελέσει προϋπόθεση για υψηλότερης ποιότητας βαθύ όργωμα και για προσποτιστική καλλιέργεια των εκτάσεων που προορίζονται για σπορά με χειμερινό ελαιοκράμβη. Οι μικροί σπόροι του ελαιοκράμβη απαιτούν πολύ καλή, σχεδόν κηπευτική, προσποτιστική προετοιμασία των αγρών. Οι βροχοπτώσεις στα τέλη Αυγούστου, μετά την εντατικοποιημένη ξηρασία, ήταν τοπικές, και μόνο σε ορισμένα σημεία στη Βόρεια Βουλγαρία (Πλέβεν, Λόβετς, Σβίστοφ) και στην Άνω Θρακική Πεδιάδα (Πλόβντιβ) είχαν οικονομικό αντίκτυπο. Το βέλτιστο αγροτεχνικό χρονικό πλαίσιο για τη σπορά του χειμερινού ελαιοκράμβη είναι μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Η περίοδος είναι κατάλληλη για τη σπορά σπανάκι για φθινοπωρινή παραγωγή.

Πηγή: ΕΕΦ