

Αγρομετεωρολογική πρόγνωση για τον Σεπτέμβριο του 2018

Автор(и): Ραϑιτελνα ζαϑιτα
Дата: 07.09.2018 Βροϑ: 9/2018



Στις αρχές Σεπτεμβρίου, οι αγρομετεωρολογικές ϑυνθήκες θα καθοριϑτούν από ξηρό, ζεϑτό και, ϑε μέρη των πεδινών περιοχών, καυτό καιρό. Μέχρι τα μέσα της πρώτης δεκάδας, οι ϑυνθήκες θα είναι κατάλληλες για την ολοκλήρωση της ϑυγκομιδής ηλίανθου, τη ϑυλλογή των πρώιμων υβριδίων καλαμποκιού, την εκτέλεϑη βαθύ άροϑη, προϑπορευτική καλλιεργητική επεξεργαϑία και τη ϑπορά του χειμερινού ελαιοκράμβη.

Οι προβλεπόμενες υπέρ το κανονικό θερμικές ϑυνθήκες ϑτις αρχές του μήνα θα επιταχύνουν την πορεία των τελικών ϑαδίων ανάπτυξη των όϑιμων καλλιεργειών. Στα μεϑοόϑιμα υβρίδια καλαμποκιού, θα παρατηρηθούν τα ϑάδια της κηρώδουϑ και της πλήρουϑ ωριμότητα, ενώ ϑτα όϑιμα υβρίδια – το ϑάδιο γάλακτοϑ και η

μετάβαση από το γάλα στην κηρώδη ωριμότητα. Στο ρύζι, θα επικρατήσει το στάδιο της γαλακτώδους ωριμότητας, και στο βαμβάκι – το άνοιγμα των παξιμαδιών.

Κατά το δεύτερο μισό της πρώτης και τις περισσότερες ημέρες της δεύτερης δεκάδας, οι αγρομετεωρολογικές συνθήκες θα είναι ιδιαίτερα δυναμικές. Προβλέπονται βροχοπτώσεις, πτώση των θερμοκρασιών και αυξημένος κίνδυνος ανάπτυξης παθογόνων που προκαλούν σήψεις – όψιμη καφέ σήψη (*Monilia fructigena*) στους καρπούς φθινοπωρινών-χειμερινών σπυροφόρων ποικιλιών, και γκρίζα μούχλα (*Botrytis cinerea*) στις όψιμες οينوποιητικές ποικιλίες αμπελιού. Φέτος, το βροχερό καλοκαίρι εμπόδισε την έγκαιρη εκτέλεση των ψεκασμών φυτοπροστασίας στα αμπέλια. Σε ορισμένα μέρη, μαζικές μολύνσεις από κακή λευκή και ωίδιο συνετέλεσαν στη μείωση της παραγωγής στα σταφύλια.

Στη δεύτερη δεκάδα του Σεπτεμβρίου, τα όψιμα υβρίδια καλαμποκιού θα εισέλθουν επίσης στα στάδια της κηρώδους και της πλήρης ωριμότητας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το στάδιο της ωρίμανσης θα παρατηρηθεί ευρέως στις καλλιέργειες ρυζιού.

Στα τέλη της δεύτερης δεκάδας, προβλέπεται αυξημένη πιθανότητα σχηματισμού παγετού στα υψηλότερα χωράφια, και κατά τη διάρκεια της τρίτης δεκάδας – επίσης σε ορισμένες από τις πεδινές περιοχές, γεγονός που απαιτεί την έγκαιρη συγκομιδή των λαχανικών καλλιεργειών που είναι ευαίσθητες σε ζημιές από παγετό.

Οι αναμενόμενες βροχοπτώσεις του Σεπτεμβρίου, γύρω και πάνω από το μηνιαίο κανονικό, θα παράσχουν υγρασία για την κανονική πορεία των αρχικών σταδίων βλάστησης του χειμερινού ελαιοκράμβη. Στα τέλη του μήνα, στον ελαιοκράμβη που σπάρθηκε εντός του βέλτιστου χρονικού παραθύρου, κατά το πρώτο μισό του Σεπτεμβρίου, θα παρατηρηθεί το στάδιο της βλάστησης. Στο στάδιο της βλάστησης, σοβαρές ζημιές στον ελαιοκράμβη προκαλούνται από το ψύλλο του καυλαμίδι (ενήλικα άτομα) και τις προνύμφες (ψευδοκάμπιες) της σφηκοψύλλης του ελαιοκράμβη.

Κατά το δεύτερο μέρος της τρίτης δεκάδας, δεν προβλέπονται σημαντικές βροχοπτώσεις. Στις τελευταίες ημέρες του μήνα, αναμένεται βελτίωση των συνθηκών για την εκτέλεση προσπορευτικής καλλιεργητικής επεξεργασίας στις εκτάσεις που προορίζονται για σπορά με χειμερινά δημητριακά. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, στα υψηλότερα χωράφια, αρχίζουν οι αγροτεχνικές περίοδοι σποράς κριθαριού και σίτου.