

Ο σκαθάρι των μπουμπουκιών της αχλαδιάς προκαλεί σοβαρές ζημιές όχι μόνο στην αχλαδιά

Автор(и): Растителна защита

Дата: 09.10.2018 Брой: 10/2018



Ο σκαθαροειδής της μηλιάς (*Anthonomus pygmaeus* Kollar) είναι ευρέως διαδεδομένος σε όλη τη χώρα και προκαλεί σοβαρές ζημιές όχι μόνο στην αχλαδιά, αλλά και στη μηλιά, το βερίκοκο και το δαμάσκηνο.

Το έντομο είναι ένα μικρό σκαθάρι με ρύγχος που αναπτύσσει μία γενιά ανά έτος. Γεννά τα αυγά του στους οφθαλμούς της αχλαδιάς το φθινόπωρο και παραμονεύει εκεί ως αυγό. Οι προνύμφες που εκκολάπτονται την άνοιξη καταστρέφουν εντελώς τους καρποφόρους οφθαλμούς, με αποτέλεσμα να μην αναπτύσσεται ούτε ένα

άνθος από αυτούς. Οι κατεστραμμένοι καρποφόροι οφθαλμοί δεν αναπτύσσονται κατά την άνθηση, στεγνώνουν και πέφτουν.

Καταπολέμηση

Η καταπολέμηση κατευθύνεται κατά των ενήλικων σκαθαριών πριν αυτά γεννήσουν τα αυγά τους – από τα τέλη Σεπτεμβρίου έως τις αρχές Οκτωβρίου. Μετά τις 20 Σεπτεμβρίου είναι καλύτερο να πραγματοποιούνται επιθεωρήσεις κουνώντας τα δέντρα, και όταν διαπιστωθεί κατά μέσο όρο πάνω από 5–8 σκαθάρια ανά δέντρο, θα πρέπει να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί εντός 5–6 ημερών η ψεκασματοποίηση.

Σε περιβόλια αχλαδιών όπου δεν έχει πραγματοποιηθεί τακτική καταπολέμηση κατά των εντόμων, ο σκαθαροειδής της μηλιάς συνήθως πολλαπλασιάζεται και η πυκνότητα του πληθυσμού του συχνά ξεπερνά το οικονομικό όριο βλαπτικότητας – 5–8 άτομα ανά δέντρο, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την ψεκασματοποίηση κατά των ενηλίκων πριν από τη γέννα με Dursban 4E – 0,15% ή Vaztak New 100EC – 0,0125%, κ.λπ. Η καταπολέμηση αυτού του εντόμου είναι αποτελεσματική μόνο κατά των ενηλίκων μορφών στις αρχές του φθινοπώρου. Αργότερα, οι προνύμφες του σκαθαροειδούς της μηλιάς αναπτύσσονται μέσα στους οφθαλμούς και η ζημιά εντοπίζεται την άνοιξη, όταν η καταπολέμηση κατά αυτών είναι πλέον αδύνατη.