

Φυτοϋγειονομική κατάσταση γεωργικών καλλιεργειών από 09.01 Ηλιέλαιο

Автор(и): БАБХ, Българска агенция по безопасност на храните

Дата: 30.10.2014 Брой: 10/2014



Τις πρώτες μέρες του Αυγούστου, οι αγρομετεωρολογικές συνθήκες στη Δυτική Βουλγαρία παρέμειναν ασταθείς. Αυτό δυσχέρανε περαιτέρω τη συγκομιδή του σιταριού και επιδείνωσε την ποιότητα του σιτηρού. Μέχρι το τέλος του μήνα, η συγκομιδή του σιταριού δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί στις υψηλότερες περιοχές των επαρχιών Kyustendil, Pernik και Σόφιας. Στα μέσα Αυγούστου, η ατμόσφαιρα σταθεροποιήθηκε, οι θερμοκρασίες αυξήθηκαν και σε διάφορα μέρη της χώρας τα μέγιστα έφτασαν μεταξύ 33-38° C.

Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, μέρος των ανοιξιάτικων καλλιεργειών ολοκλήρωσε την ανάπτυξή του. Ξεκίνησε η συγκομιδή του ηλιοτρόπιου και η σπορά της ελαιοκράμβης. Στη Νότια Βουλγαρία, σε περιοχές με λιγότερες βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου, ξεκίνησε επίσης η συγκομιδή του πρώιμου υβριδικού καλαμποκιού.

ΗΛΙΑΝΘΟΣ**Φαινοφάση:** "ωρίμανση" – "συγκομιδή"

Η καλλιέργεια βρίσκεται σε πολύ καλή φυτοϋγειονομική κατάσταση. Κατά τη διάρκεια της βλάστησης του ηλιοτρόπιου, τα αποθέματα υγρασίας του εδάφους στις περισσότερες επαρχίες της χώρας ήταν εντός βέλτιστων ορίων. Κατά τον Αύγουστο, καταγράφηκε αυξημένη επίπτωση της **καφέ κηλίδας του φύλλου (φομώψη)** στις επαρχίες Vidin, Veliko Tarnovo και Pernik – από 7 έως 15% των φυτών επηρεάστηκαν. Εκδηλώσεις **άλτερναριας** με ασθενή έως μέτρια επίπτωση υπήρχαν στις περιοχές των Vidin, Pernik, Targovishte και Shumen. Το υγρό καιρό με μέτριες θερμοκρασίες ευνοούσε την ανάπτυξη της **γκρίζας σήψης** στα κεφάλια του ηλιοτρόπιου. Μεμονωμένα φυτά με κηλίδες στα κεφάλια βρέθηκαν στην επαρχία Pernik. Η επίπτωση φτάνει έως και 5,8% των φυτών στην επαρχία Silistra σε έκταση 15 χιλιάδες στρεμμάτων. Στην επαρχία Silistra, σε έκταση 15 χιλιάδων στρεμμάτων, η επίπτωση φτάνει έως και 5,8% των φυτών. Η συγκομιδή της καλλιέργειας έχει ξεκινήσει.