

Pronóstico agrometeorológico para marzo de 2019

Автор(и): Растителна защита
Дата: 18.03.2019 *Брой:* 3/2019



A principios de marzo, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por un tiempo cálido para la temporada. Durante la primera decena, en la mayoría de las regiones cultivables del país, los valores previstos de las temperaturas medias diarias superarán el mínimo biológico necesario para la reanudación de los procesos de vegetación en los cultivos de cereales de invierno y la colza.

A principios de la segunda decena, se pronostica un descenso de las temperaturas, más significativo en el norte de Bulgaria y en los campos altos, lo que limitará y retrasará el desarrollo de los cultivos agrícolas. Durante esta decena, las condiciones para una vegetación lenta en los cultivos de cereales de invierno se crearán principalmente en las regiones extremas del sureste y del sur del país.

A finales de la segunda y principios de la tercera decena de marzo, se espera una mejora de las condiciones térmicas y una activación de los procesos de vegetación en los cultivos sembrados en otoño y en las plantaciones perennes. Para finales de marzo, la mayoría de las siembras de trigo y cebada de desarrollo tardío que hayan pasado el invierno en la fase de 2-3 hojas entrarán en la fase de ahijamiento. En los cultivos de cereales de invierno que se ahijaron en otoño, se observará un aumento del coeficiente de ahijamiento. A finales de marzo, la colza que haya pasado el invierno en la fase de roseta formará ramas.

En marzo, tendrán lugar las fases de hinchazón de yemas y apertura de yemas en los cultivos frutales.

A finales de mes, en las especies de floración temprana (almendro, albaricoquero, melocotonero) se observará la fase de yema floral, y en algunos lugares, principalmente en las regiones del sur, también el inicio de la floración. Durante el mes, las temperaturas mínimas previstas, de hasta -8°C, supondrán un riesgo para los árboles frutales más adelantados que hayan entrado en las fases de formación de yemas y floración. Las precipitaciones previstas en marzo, en torno a la norma, aumentarán las reservas de humedad del suelo en las capas de un metro y más profundas. A finales de febrero, en la mayoría de las regiones cultivables, las reservas de humedad del suelo para los cultivos de cereales de invierno en la capa de un metro estaban por encima del 90% de la capacidad de campo (CC). Se observaron excepciones en algunos lugares de la Llanura Danubiana (estación agrometeorológica de Novachene), en las regiones extremas del sur (Haskovo) y del este (D. Chiflik), donde el nivel de reservas de humedad era inferior, del 85-86% de la CC. Durante el mes, las condiciones más favorables para realizar la labranza previa a la siembra de las superficies destinadas a la siembra de cultivos de primavera tempranos y medio-tempranos, y para realizar tratamientos fitosanitarios en los frutales, se darán a principios de mes, en la segunda mitad de la segunda decena, y a mediados de la tercera decena. A mediados de marzo comienza la ventana agrotécnica (15-20.03) para la siembra de girasol en el sur de Bulgaria, y a mediados de la tercera decena (25.03-5.04) en la Llanura Danubiana.

Fuente: NIMH