

Las condiciones adecuadas para realizar las labores de labranza previas a la siembra y la siembra de girasol estarán presentes a finales de marzo.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 24.03.2019 *Брой:* 3/2019



Durante el próximo período, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por temperaturas superiores a las normas climáticas para la tercera decena de marzo.

De manera inusual para el comienzo de la primavera, el desarrollo de los cultivos de invierno en parte de las regiones de campo del país tendrá lugar bajo reservas de humedad del suelo insatisfactorias en la capa de 50 cm, consecuencia de precipitaciones por debajo de lo normal a finales del invierno, temperaturas de marzo

superiores a lo normal y la activa vegetación en curso de los cultivos. A finales de la segunda decena de marzo, las reservas de humedad más bajas en la capa de 50 cm, medidas en trigo, se registraron en lugares de las regiones meridionales y sudorientales del país, por debajo del 65% de la capacidad de campo. Las mejores reservas de humedad, superiores al 85-90% de la capacidad de campo, se reportan para los cultivos de invierno en las partes noroccidentales de la Llanura Danubiana.

Hacia el final del período, se espera un descenso de las temperaturas y un cambio en las condiciones agrometeorológicas. Los valores pronosticados de las temperaturas mínimas, en algunos lugares hasta -2°C, suponen un riesgo para la floración y el cuajado de los frutos de las especies de fruta de hueso que están avanzadas en su desarrollo, especialmente si las bajas temperaturas persisten durante más tiempo.

Se esperan más precipitaciones y las condiciones para la germinación de los cultivos de primavera sembrados mejorarán.

En el trigo, se observará a gran escala la etapa de crecimiento de ahijamiento, y en algunos lugares de las regiones nororientales (Tsarev Brod, Dolni Chiflik) el comienzo del alargamiento del tallo. En la colza, estará en curso la formación de ramificación.

Durante la mayoría de los días del período, las condiciones serán adecuadas para realizar la labranza previa a la siembra y la siembra de girasol. Durante el período, expira el plazo óptimo para la siembra de girasol en el sur de Bulgaria. A mediados de la tercera decena de marzo, comienza la ventana agrotécnica para la siembra de girasol en la Llanura Danubiana (25.03–05.04).

Fuente: NIMH