

Cuidado de protección vegetal para la vid

Автор(и): Растителна защита
Дата: 30.03.2019 Брой: 3/2019



Principales plagas para marzo y abril

Excoriosis de la vid *Phomopsis viticola*

Ácaro rojo europeo *Panonychus ulmi*

Polilla del racimo de la vid *Lobesia botrana*

Excoriosis de la vid

El agente causal de la enfermedad pasa el invierno como cuerpos fructíferos en la corteza de los brotes maduros y como micelio en las yemas y la madera. El período crítico para el desarrollo de la enfermedad es desde el estado de crecimiento de la vid "hinchazón de yemas" hasta el estado de crecimiento "3ª–4ª hoja", combinado con un tiempo moderadamente cálido y una humedad del aire superior al 98–100%. Los síntomas de la enfermedad se manifiestan en la muerte de las yemas primarias, el alargamiento de los brazos y su secado.

Estrategia de control de plagas

El tratamiento con productos fitosanitarios es obligatorio si la enfermedad fue detectada en los viñedos el año anterior. Se realiza una única pulverización independiente cuando aproximadamente el 40% de las yemas ubicadas en la base de los brotes se encuentran en el estado de crecimiento "punta verde". En una primavera fría y lluviosa, cuando el período susceptible a la excoriosis se prolonga, se realiza una segunda pulverización cuando el 30–40% de las yemas en la base de los brotes están en el estado de crecimiento "2–3 hojas".

Productos fitosanitarios autorizados

Verita WG - 0,2%; Mikal Flash - 0,3%; Momentum Extra WG - 300 g/ha; Pencozeb 75 WG - 210 g/ha; Solofol - 188 g/ha; Thiovit Jet 80 WG - 1250 g/ha; Folder 80 WG - 187,5 g/ha; Follow 80 WG / Friller 80 WG / Flowet 80 WG - 187,5 g/ha; Delan 700 WDG - 0,2%; Kumulus DF - 750 g/ha.

Ácaro rojo europeo

Las larvas, ninfas y ácaros adultos causan daños al succionar la savia y los granos de clorofila de las yemas en desarrollo y del envés de las hojas. Secretan enzimas que descomponen los pigmentos de las hojas. Como resultado del daño, el color del limbo foliar cambia ligeramente. A distancia, las hojas aparecen de color gris-marrón y tienen el margen enrollado hacia arriba.

Estrategia de control de plagas

La pulverización se realiza hasta el estado de crecimiento "hinchazón de yemas" y al comienzo de la eclosión de los huevos.

Productos fitosanitarios autorizados

Para Sommer - 3%; Zoom 11SC - 12,55 ml/ha; Ovipron TOP EC – 2500–3500 ml/ha; Thiovit Jet 80 WG - 2000 g/ha.

Polilla del racimo de la vid

El vuelo de las mariposas de la generación invernada comienza cuando la temperatura media diaria del aire, durante un período de unos diez días, supera los 10–12 °C.

Estrategia de control de plagas

En marzo y abril, para monitorear el vuelo y el número de mariposas atraídas de la primera generación de la plaga, se cuelgan trampas de feromonas en el sistema de espaldera de los viñedos (1 trampa por cada 25–30 ha de viñedos).