


A principios de mayo existen condiciones adecuadas para llevar a cabo las actividades agrotécnicas estacionales.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 01.05.2019 *Брой:* 5/2019



A finales de abril y principios de mayo, se espera un cambio en las condiciones agrometeorológicas. El pronóstico de aumento de las temperaturas, combinado con la mejora de las reservas de humedad del suelo del período anterior como resultado de las precipitaciones registradas, creará condiciones para un curso acelerado de los procesos de vegetación en los cultivos agrícolas.

Durante el período, el trigo en el norte de Bulgaria se encontrará en la etapa de alargamiento del tallo, mientras que en partes del sur de Bulgaria comenzará la etapa de espigado. En los cultivos de colza en la Llanura

Danubiana, tendrán lugar las etapas de formación de yemas y floración, y en el sur de Bulgaria se observará a gran escala la floración y la formación de vainas. En las áreas sembradas con girasol, ocurrirá la formación de hojas (formación de 1-2 pares de hojas verdaderas). En el maíz, se observará la emergencia y el comienzo de la formación de hojas.

En los cultivos de cereales de invierno, durante las etapas de alargamiento del tallo y espigado, el daño a las plantas es causado por el crisomélido común de los cereales y el chinche del trigo. Los cultivos también deben ser monitoreados para detectar la aparición y desarrollo del oídio. Cuando el desarrollo de enfermedades y plagas supere el umbral económico de daño, es necesario realizar tratamientos con pesticidas.

En las especies frutales, después del final de la floración, se realizan tratamientos con fungicidas contra la podredumbre de la flor (podredumbre parda temprana) en frutales de hueso, la enrolladura de la hoja del melocotonero y la sarna en especies de frutales de pepita.

Se presentarán condiciones favorables para la implementación de actividades agrotécnicas estacionales (pulverización para protección de plantas, cultivo del suelo en huertos) al principio y al final del período, cuando se pronostica un tiempo relativamente más estable sin precipitaciones.

Fuente: NIMH