

El clima húmedo durante la primera quincena de mayo es una condición previa para el desarrollo de patógenos fúngicos.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 07.05.2019 Брой: 5/2019



El clima húmedo creará condiciones para la aparición y desarrollo de patógenos fúngicos, cuya prevención requiere la aplicación de fungicidas sistémicos.

Durante el período del 3 al 9 de mayo, se pronostican condiciones agrometeorológicas dinámicas y variables. Los procesos de vegetación en los cultivos agrícolas se desarrollarán con temperaturas medias por debajo de las normas climáticas y con precipitaciones frecuentes, según el pronóstico sinóptico.

En la primera mitad del período, se esperan precipitaciones, en muchos lugares de las zonas bajas del país también intensas, lo que mantendrá las reservas de humedad del suelo mejoradas tras la superada sequía primaveral temprana. El clima ventoso previsto limitará adicionalmente las posibilidades de llevar a cabo actividades de protección vegetal en los cultivos de cereales de invierno, colza y en las plantaciones frutales permanentes.

Durante el período, el trigo se encontrará en las etapas de alargamiento del tallo, transición del alargamiento del tallo al espigado y espigado. En la colza, se observará floración, formación y crecimiento de las vainas. En los cultivos de primavera sembrados, tendrá lugar la formación de hojas.

El clima húmedo creará condiciones para la aparición y desarrollo de patógenos fúngicos, cuya prevención requiere la aplicación de fungicidas sistémicos.

Al final del período, se pronostica una mejora en las condiciones agrometeorológicas (un comienzo de aumento de las temperaturas, debilitamiento del viento, baja probabilidad de precipitaciones) y la creación de oportunidades más favorables para llevar a cabo actividades agrotécnicas.

Fuente: NIMH