

Pronóstico agrometeorológico para el mes de mayo

Автор(и): Растителна защита
Дата: 10.05.2019 Брой: 5/2019



A principios de mayo, el desarrollo de los cultivos agrícolas procederá bajo temperaturas inferiores a las normales y con buenas reservas de humedad del suelo como resultado de las precipitaciones superiores a lo normal en abril. Las precipitaciones de abril (Pleven - 116l/m², Veliko Tarnovo - 63l/m², Lovech – 125l/m², Razgrad - 64l/m², Dobrich - 60l/m², Sofía - 78l/m², Sandanski - 58l/m², Pazardzhik - 60l/m², Plovdiv - 58l/m², Haskovo - 89l/m², Kardzhali - 75l/m², Elhovo - 79l/m², Stara Zagora - 55l/m², Karnobat - 52l/m²), tras la sequía de principios de primavera, fueron decisivas para superar el déficit de humedad del suelo en los cultivos sembrados en otoño. Las precipitaciones previstas durante la primera decena de mayo mantendrán un nivel muy bueno de reservas de humedad en las capas de suelo de 50cm y 100cm, por encima del 85% de la

capacidad de campo (CC). Esta precipitación tendrá un efecto beneficioso sobre los cultivos de cereales de invierno y la colza, que se encuentran en la etapa reproductiva de su desarrollo, con mayores requisitos de humedad del suelo. Durante este período, en el trigo y la cebada en las regiones de campo del país, ocurrirán la etapa de alargamiento del tallo, la transición del alargamiento del tallo al espigado, y la etapa de espigado. En la colza, tendrán lugar la floración, la fertilización y la formación de vainas.

A finales de la primera decena, se pronostican heladas en los campos más altos, lo que debe tenerse en cuenta al trasplantar plántulas de hortalizas y tabaco. Se espera una mejora sustancial de las condiciones térmicas y una aceleración de los procesos de vegetación en los cultivos agrícolas durante la primera mitad de la segunda decena.

Durante la segunda mitad de mayo, las condiciones agrometeorológicas permanecerán inestables, con precipitaciones frecuentes. El desarrollo de los cultivos agrícolas procederá a temperaturas alrededor y por encima de las normas climáticas. Durante este período, la formación y el llenado del grano en los cultivos de cereales de invierno tendrán lugar bajo reservas de humedad del suelo muy buenas y óptimas. A finales de la tercera decena, en el trigo y la cebada en las regiones del sur y en lugares de la Llanura Danubiana, se observará el comienzo de la etapa de madurez lechosa. Durante el mes, ocurrirá la formación de hojas en el maíz y el girasol. A finales de mayo, en el girasol sembrado dentro del marco de tiempo agrotécnico, se observará la formación de la inflorescencia. Las frecuentes precipitaciones en mayo crearán condiciones para un aumento del fondo de infección de una serie de enfermedades fúngicas: en el trigo royas (parda, amarilla) y fusariosis de la espiga; mildius en cultivos hortícolas y vid; podredumbre parda temprana y cribado en frutales de hueso, sarna en especies de frutales de pepita, etc. Durante el mes, se darán condiciones más adecuadas para realizar pulverizaciones de protección vegetal a mediados de la primera, en la primera mitad de la segunda, y en la tercera decena.

En mayo, se pronostica una mayor probabilidad de granizo. En caso de daños parciales por granizo, es aconsejable que los cultivos afectados sean tratados en la primera oportunidad con fungicidas que contengan cobre para una curación más rápida de las heridas y una reducción del riesgo de infecciones secundarias.

Fuente: NIMH