

Pronóstico agrometeorológico para el mes de junio

Автор(и): Растителна защита
Дата: 05.06.2019 *Брой:* 6/2019



Durante la mayor parte de los días de junio, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por un tiempo inestable con precipitaciones de distribución irregular, lo que también resultará en diferencias sustanciales en los niveles de reserva de humedad del suelo. En el oeste de Bulgaria, donde se espera que las precipitaciones de junio, al igual que en mayo, alcancen y superen las normas mensuales, se pronostican reservas de humedad del suelo muy buenas. Para los cultivos de primavera, en la capa de 50 y 100 cm se mantendrán por encima del 80% de la capacidad de campo (CC). Se esperan niveles más bajos de reservas de humedad del suelo en las regiones orientales, donde también se pronostican menos precipitaciones en junio.

Durante el primer y segundo períodos decádicos, el desarrollo de los cultivos agrícolas procederá a un ritmo moderado, bajo temperaturas cercanas a las normas climáticas. A principios de junio, en los campos más altos, se producirá el llenado del grano en los cultivos de cereales de invierno. En el trigo de las zonas de tierras bajas, se observará la etapa de madurez lechosa, mientras que en la cebada – madurez lechosa y transición a la madurez cerosa. En el trigo, durante el período interfenológico de llenado del grano – madurez lechosa, las larvas del chinche del trigo (*Eurygaster integriceps*) causan daños graves. Durante este período, los cultivos de trigo deben inspeccionarse para detectar la presencia de la plaga y, con densidades que superen el umbral de daño económico (2 larvas/m²), el tratamiento insecticida es imperativo.

A finales del primer y principios del segundo período decádico, la cebada estará predominantemente en madurez cerosa, y la colza estará en la etapa de maduración.

Durante el tercer período decádico, el desarrollo de los cultivos agrícolas procederá a un ritmo acelerado, bajo condiciones térmicas por encima de lo normal. En la primera mitad de este período decádico, el trigo en las zonas de tierras bajas alcanzará la madurez cerosa y completa. Para finales de junio, algunos de los cultivos de primavera entrarán en etapas de desarrollo reproductivo – en el girasol, ocurrirá el inicio de la floración, y en los híbridos de maíz temprano – espigado y floración de la espiga.

Durante el mes, las temperaturas máximas pronosticadas, en algunos lugares de hasta 35°C, tendrán un impacto negativo en la floración y fertilización de los cultivos hortícolas. Las condiciones meteorológicas de junio mantendrán un fondo infeccioso elevado de patógenos fúngicos: podredumbre parda tardía en cultivares tardíos de cereza, sarna y oídio en frutales, mildiu en viñedos y cultivos hortícolas. En la vid, el período interfenológico desde la floración de las inflorescencias hasta la formación de bayas del tamaño de un guisante es crítico para la infección por mildiu. Durante el primer período decádico de junio, se pronostica una mayor probabilidad de granizo, con riesgo de encamado de cultivos y daños adicionales a los cultivos agrícolas. Después de una granizada, los cultivos frutales y hortícolas afectados deben tratarse con fungicidas que contengan cobre a la primera oportunidad.

Durante el mes, las condiciones más adecuadas para realizar labores de labranza del suelo en vegetación para cultivos de primavera ocurrirán en el tercer período decádico.