

23 de febrero de 2024

Pronóstico de cultivos de invierno para 2024

Clima inestable y temperaturas por encima de lo normal

Автор(и): Растителна защита
Дата: 26.06.2019 *Брой:* 6/2019



Durante la mayor parte del período de siete días (21–27.06.2019), las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por un tiempo inestable y temperaturas por encima de lo normal. Al inicio del verano, las temperaturas máximas extremadamente altas previstas, que en algunos lugares alcanzarán los 37–38°C, dificultarán la vegetación de los cultivos de primavera. Estos valores tendrán un impacto negativo en la formación de los órganos reproductivos de algunos cultivos hortícolas (judías verdes, tomates, pimientos, pepinos, etc.), y con una baja humedad atmosférica podrían provocar la caída de flores y cuajado de frutos. Se

pronostica una disminución de las temperaturas y una mejora en las condiciones para el desarrollo de los cultivos agrícolas para mediados del período.

Durante el período, en el trigo de las zonas de llanura, se observará la fase de grano pastoso y madurez completa, y en los campos más altos – grano lechoso y transición a grano pastoso. En el girasol, tendrá lugar la formación de la inflorescencia, y en algunos lugares de la Llanura Danubiana (las estaciones agrometeorológicas de Băzovec, Pavlikeni) también se observará el inicio de la floración en las parcelas. En el maíz, se producirá la formación de hojas. Hacia el final del período, en los híbridos tempranos, se observará el inicio del espigado. Antes del espigado, es necesario inspeccionar las parcelas de maíz para detectar la presencia de una de las plagas económicamente más importantes – el taladro del maíz (*Ostrinia nubilalis*). Cuando la densidad de la plaga supere el nivel de daño económico (NDE) (10 puestas por 100 plantas), es necesario un tratamiento insecticida oportuno (contra las larvas jóvenes antes de que penetren en los tallos).

Las precipitaciones durante el período en muchas partes del país, con excepción de las regiones del sureste y la costa del Mar Negro, impedirán temporalmente la cosecha de la cebada y el trigo. Se pronostica nuevamente una mayor probabilidad de granizo, con riesgo de encamado de los cultivos y desgrane. Tras una granizada, se recomienda tratar los cultivos hortícolas y viñedos afectados con fungicidas que contengan cobre a la primera oportunidad.

Fuente: NIMH