

Pronóstico agrometeorológico para agosto

Автор(и): Растителна защита
Дата: 01.08.2019 Брой: 8/2019



Durante la mayor parte de la primera decena de agosto, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por tiempo inestable y temperaturas en torno y ligeramente por debajo de la norma para el período. Las condiciones meteorológicas previstas a principios de mes incrementarán el nivel de infecciones de ciertos patógenos fúngicos: tizones en cultivos hortícolas de producción tardía de campo, podredumbre parda tardía en frutales y moho gris en las variedades tempranas de uva en maduración.

Las precipitaciones de finales de julio, que en algunos lugares de las regiones noroccidentales y centrales superaron los 30-40 l/m² (N. Selo, Vidin, Vratsa, Montana, Lovech, V. Tarnovo), y las lluvias previstas durante la primera decena de agosto, tendrán un efecto beneficioso sobre los segundos cultivos y sobre los híbridos de maíz más tardíos, en los que tendrá lugar la formación y llenado del grano. Durante la decena, los híbridos de

maíz de media estación se encontrarán en la fase de madurez lechosa, mientras que los híbridos tempranos alcanzarán la madurez cerosa y completa (estaciones agrometeorológicas Bazovets, Kneja, Glavinitsa, Pazardzhik, Plovdiv). En el girasol, en la Llanura Danubiana y en las regiones meridionales, se producirá la fase de maduración.

A finales de la primera decena, se pronostica un aumento sustancial de las temperaturas y una progresión acelerada de las etapas finales de desarrollo de los cultivos de campo tardíos. Durante la segunda y tercera decena, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por un tiempo relativamente seco y temperaturas en torno y por encima de las normas climáticas.

Durante la segunda quincena de agosto, una gran parte de los cultivos de campo tardíos completarán su desarrollo. En el girasol, se observará la madurez técnica masiva, y en la soja, la fase de maduración. A finales de mes, predominará la madurez cerosa en los híbridos de maíz de media-tardía estación. En el arroz, se producirá la fase de madurez lechosa, y en el algodón, la apertura de las cápsulas.

Durante la segunda quincena del mes, se profundizará el déficit de humedad del suelo en los segundos cultivos y hará necesario aumentar las dosis de riego. En muchos lugares de las regiones de campo, la falta de humedad en las capas superiores del suelo dificultará la realización de calidad de la labranza profunda y el laboreo previo a la siembra de las áreas destinadas a la siembra de colza de invierno. Los períodos agrotécnicos de siembra para la colza comienzan en la tercera decena de agosto.

En agosto, para las variedades tardías de frutales, no se debe subestimar la actividad dañina de la última generación de polillas de la fruta. El tiempo relativamente seco durante la mayor parte de los días del mes será un factor predisponente para un aumento de las poblaciones de ácaros. En los viñedos, es necesario monitorear la aparición y densidad de las larvas de la tercera generación de la polilla del racimo de la vid. Las aplicaciones de protección vegetal deben realizarse durante las horas más frescas del día con productos que tengan un intervalo pre-cosecha apropiado, de acuerdo con el período de maduración de los cultivos.

Fuente: NIMH