

Pronóstico agrometeorológico para septiembre

Автор(и): Растителна защита
Дата: 16.09.2019 *Брой:* 9/2019



A principios de septiembre, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por un tiempo seco, cálido y, en muchos lugares de las zonas de llanura, caluroso, lo que acelerará el progreso de las etapas finales de desarrollo de los cultivos de campo tardíos. Durante la primera semana del mes, los híbridos de maíz de ciclo medio-tardío alcanzarán la madurez cerosa y completa, mientras que los híbridos tardíos estarán en la etapa de grano lechoso y en transición a la madurez cerosa.

En la mayoría de los días de la primera decena, las condiciones seguirán siendo adecuadas para llevar a cabo la cosecha de girasol y para liberar las áreas sembradas con híbridos de maíz más tempranos. Al final de la decena, se pronostica un descenso de las temperaturas y un cambio en las condiciones agrometeorológicas. Las precipitaciones previstas, tras la sequía intensificada a finales del verano, mejorarán el estado de las capas

superiores del suelo, lo que es un requisito previo para una labranza y siembra de colza de invierno de mayor calidad. Los períodos agrotécnicos óptimos para la siembra de colza son hasta finales de la segunda decena de septiembre.

Durante la segunda y tercera decena, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por temperaturas cercanas a las normas climáticas. Para mediados de septiembre, los híbridos de maíz tardíos habrán completado su desarrollo; el arroz estará en madurez cerosa y completa, y la remolacha azucarera alcanzará la madurez técnica. En la tercera decena, antes de lo habitual, las variedades tardías de uva para vino alcanzarán la madurez tecnológica. El algodón estará en la etapa de maduración.

Las precipitaciones pronosticadas durante la segunda mitad de la segunda y el inicio de la tercera decena serán de gran importancia para la emergencia normal de la colza. En las regiones donde la humedad no sea un factor limitante, en los cultivos sembrados dentro del período agrotécnico, se observará la etapa de emergencia a finales de septiembre. En la etapa de emergencia, el daño grave a la colza es causado por el pulguilla del tallo de la col (individuos adultos) y la mosca sierra de la col (falsas orugas), lo que requiere un monitoreo durante esta etapa para determinar la presencia y densidad de población de las plagas. Cuando la densidad supere el umbral económico de daño (UED para el pulguilla del tallo de la col - 2 escarabajos por m²; UED para la mosca sierra de la col 2-3 falsas orugas por m²), el tratamiento es obligatorio.

En septiembre, para los cultivos hortícolas de producción de campo tardía, no se deben subestimar los tratamientos de protección vegetal contra las orugas de la tercera generación del gusano del algodón, ya que causan daños y deterioran la calidad del rendimiento hortícola.

Durante la tercera decena del mes, en los campos más altos no se puede descartar la posibilidad de formación de heladas, lo que debe tenerse en cuenta al cosechar cultivos hortícolas sensibles a las heladas (tomates, pimientos).

Fuente: NIMH