

Pronóstico agrometeorológico para octubre

Автор(и): Растителна защита
Дата: 11.10.2019 *Брой:* 10/2019



En octubre, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por temperaturas en torno y por encima de las normas climáticas y por precipitaciones cercanas a los promedios mensuales.

A principios de octubre, el pronóstico de temperaturas superiores a lo normal, con valores máximos de hasta 29-30°C, acelerará la maduración de las variedades tardías de frutales y vides y será una condición previa para la formación de un rendimiento adicional de los cultivos hortícolas tardíos.

Tras el tiempo inusualmente cálido durante la segunda mitad de la primera decena, se espera una normalización de las condiciones térmicas. Las precipitaciones de finales de septiembre y las lluvias previstas durante los primeros diez días de octubre proporcionarán humedad para la emergencia de los cultivos

sembrados a principios de otoño. La sequía de finales de verano en muchas partes del país retrasó la labranza previa a la siembra de las áreas destinadas a cultivos de otoño. Por esta razón, en gran parte de las regiones de campo se han perdido las fechas agrotécnicas de siembra para la colza de invierno. Octubre es el período óptimo para la siembra de cultivos cerealistas de invierno. Durante la primera decena es el período agrotécnico para la siembra de trigo en el norte de Bulgaria, del 15 al 25 de octubre en el sur de Bulgaria, y a finales de mes – a lo largo de la costa del Mar Negro.

Durante la mayoría de los días de la segunda y tercera decena, el desarrollo de las poblaciones sembradas de colza y cultivos cerealistas de invierno procederá a un ritmo moderado, bajo condiciones térmicas cercanas a la norma. Se espera que las precipitaciones pronosticadas en la segunda mitad de octubre mejoren el nivel de las reservas de humedad del suelo en la capa de 50 cm y las condiciones para el curso de las fases iniciales de vegetación de los cultivos de otoño. A finales de mes, en el trigo, dependiendo de las fechas de siembra, se observarán las siguientes etapas: emergencia, tercera hoja y comienzo del ahijamiento, principalmente en las poblaciones sembradas a principios de octubre. En la colza, estará en progreso la formación de hojas. A finales de octubre, en las poblaciones de colza sembradas más tempranamente, sembradas en septiembre, se observará el comienzo de la etapa de formación de roseta.

En octubre, los cultivos de otoño son atacados por una serie de plagas. En los cultivos cerealistas de invierno, se debe monitorear la actividad dañina del topillo común, el escarabajo de la hoja del trigo y las moscas de los cereales, y cuando la densidad de plagas exceda el nivel de daño económico (NDE), se debe realizar un tratamiento oportuno. Para el topillo común, el NDE es de 2 colonias activas por decárea; para el escarabajo de la hoja del trigo – 3 larvas/m².

En la colza, durante el mes se deben realizar inspecciones para detectar la aparición del pulguilla de la col (individuos adultos) y la mosca sierra de la col (falsas orugas), y cuando sus números excedan el NDE, se debe realizar una pulverización insecticida.

Fuente: NIMH