

Pronóstico agrometeorológico para finales de octubre

Автор(и): Растителна защита
Дата: 25.10.2019 *Брой:* 10/2019



En la mayoría de los días del período venidero, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por un tiempo seco y cálido para la temporada, lo que conducirá a un aumento del déficit de humedad en los cultivos de otoño. En la mayor parte del país, especialmente en lugares del noroeste de Bulgaria – las estaciones agrometeorológicas de Kneja y Băzovec, en la llanura de Sofía – la estación agrometeorológica de Lozen, y en la llanura tracia superior – las estaciones agrometeorológicas de Plovdiv, Pazardzhik y Sliven, las reservas de humedad del suelo en la capa de 50 cm son escasas, por debajo del 45–50% de la capacidad de campo, y en algunos lugares completamente agotadas. En estas áreas, el déficit de humedad restringirá y retrasará el desarrollo del trigo, la cebada y la colza de invierno.

Las precipitaciones pronosticadas para finales del período no tendrán significación económica. En algunos lugares de la llanura danubiana existe un riesgo real de desecación de parte de los cultivos de cereales de invierno que han germinado.

Contrariamente al contexto de sequía intensificada, hay excepciones en las regiones extremas del sur y sureste, donde durante la primera decena de octubre cayeron mayores cantidades de precipitación – más de 25–30 l/m² – Sandanski, Kardzhali, Haskovo, Elhovo y Burgas. Estas mejoraron las condiciones para la siembra y para el progreso de las etapas iniciales de la vegetación de los cultivos de otoño sembrados.

Durante el próximo período, en las regiones donde la humedad no es un factor limitante, se observará la emergencia y el comienzo de la formación de hojas en el trigo y la cebada. Parte de los cultivos en las regiones del sur, principalmente aquellos sembrados a principios de octubre, entrarán en la etapa de la tercera hoja – la estación agrometeorológica de Karnobat.

Durante la última semana de octubre, las condiciones serán adecuadas para limpiar las áreas de cultivos en hileras tardíos y para cosechar la producción de variedades de árboles frutales de otoño-invierno. El período es adecuado para plantar frambuesas y grosellas negras.

Fuente NIMH