

Pronóstico agrometeorológico para noviembre

Автор(и): Растителна защита
Дата: 13.11.2019 *Брой:* 11/2019



La prolongada sequía otoñal ha retrasado el desarrollo de los cultivos de cereales de invierno y la colza, y ha puesto en duda la supervivencia de parte de los sembrados emergidos. El contenido de humedad del trigo en las capas de suelo de 50 cm y 100 cm es inusualmente bajo para mediados de otoño en la mayor parte del país. En algunas zonas del noroeste de Bulgaria, el Campo de Sofía y la Llanura Alta de Tracia (estaciones agrometeorológicas: Knezha, Băzovec, Lozen, Plovdiv, Pazardzhik, Sliven) el nivel de las reservas de humedad del suelo en la capa de un metro está por debajo del 50% de la capacidad de campo.

Durante la primera quincena de noviembre, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por temperaturas superiores a lo normal. Las precipitaciones previstas al principio y al final de la primera decena,

en la mayoría de las zonas de cultivo, serán insuficientes para superar el déficit de humedad en las capas superiores del suelo para los cereales de invierno y la colza.

Se pronostican precipitaciones de importancia agronómica y un aumento sustancial de las reservas de humedad del suelo en la capa de 50 cm para la segunda quincena de noviembre. En la mayoría de los días de este período, el desarrollo de los cultivos de cereales de invierno y la colza en las zonas de cultivo procederá con temperaturas medias diarias cercanas a las normas climáticas.

A finales de la segunda decena, se espera una disminución sustancial de las temperaturas y, en los campos más altos, donde no se descarta la nevada, los procesos vegetativos en los cultivos de otoño disminuirán.

Durante la tercera decena de noviembre, el desarrollo de los cultivos de otoño en la mayoría de las zonas de cultivo procederá a un ritmo lento, con temperaturas que se acercan al mínimo biológico requerido para la vegetación del trigo, la cebada y la colza de invierno. Las condiciones para procesos vegetativos más activos en los cultivos de otoño se crearán principalmente en las regiones meridionales y sudorientales del país. A finales de noviembre, la etapa de crecimiento de la tercera hoja predominará en el trigo y la cebada. La etapa de emergencia se observará en los sembrados de noviembre más tardíos. En parte de los cultivos de cereales de invierno en las regiones más meridionales y orientales, que formaron 2-3 hojas en octubre, se observará la etapa de ahijamiento. En la colza, como resultado de la sequía otoñal, solo una pequeña parte de los sembrados logrará, para finales de noviembre, entrar en el comienzo de la etapa de formación de roseta (5-6 hojas).

Las temperaturas mínimas pronosticadas durante el mes, en el rango de menos 5-8°C, están por encima de los niveles críticos para los cultivos de cereales de invierno retrasados en la etapa de emergencia.

Las condiciones más adecuadas para plantar árboles frutales y para llevar a cabo las pulverizaciones de protección fitosanitaria de otoño en noviembre ocurrirán durante la primera quincena del mes.

Durante las dos primeras semanas de noviembre, se debe continuar monitoreando los cultivos de otoño, especialmente aquellos cultivados en monocultivo, para determinar la densidad de población de ciertas plagas: moscas de los cereales, topillo común, mosca de la colza (falsas orugas), y, donde sus números excedan el nivel de daño económico (NDE), se debe realizar un tratamiento oportuno. El NDE para el topillo común es de 2 colonias activas por decárea, y para las larvas (falsas orugas) de la mosca de la colza, de 2-3 por m².

Fuente: NIMH