

Pronóstico agrometeorológico para diciembre

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.12.2019 Брой: 12/2019



Las temperaturas superiores a lo normal y la mejora de las reservas de humedad del suelo durante la segunda quincena de noviembre prolongaron la vegetación otoñal del trigo, la cebada y la colza. Durante el primer período decenal de diciembre, las condiciones agrometeorológicas serán muy dinámicas. El enfriamiento previsto hacia mediados del período conducirá a una desaceleración y, en partes del norte de Bulgaria y las regiones occidentales, donde se esperan precipitaciones, incluida nieve, a un cese de los procesos de vegetación en los cultivos de cereales de invierno y la colza. Al final del primer período decenal se espera un aumento de las temperaturas, pero sus valores medios diarios se mantendrán por debajo del mínimo biológico requerido para la vegetación de los cultivos sembrados en otoño.

Durante la mayoría de los días del segundo y tercer período decenal, las temperaturas previstas, en torno y por encima de las normas climáticas, mantendrán los cultivos de cereales de invierno en relativa latencia en la mayor parte del país. Son posibles excepciones para el trigo y la cebada en las regiones más meridionales y a lo largo de la costa del Mar Negro. Durante los períodos relativamente más cálidos de la segunda quincena del mes en estas zonas, existe la probabilidad de que se creen condiciones para una reanudación a corto plazo de los procesos de vegetación en los cultivos sembrados en otoño, pero no se espera ningún cambio en los estadios fenológicos de los cultivos.

Como resultado de la prolongada sequía otoñal, los cultivos entrarán en el invierno en diferentes etapas. En la mayor parte del país, con excepción de algunas localidades del sureste de Bulgaria, el déficit hídrico del suelo retrasó la vegetación del trigo, la cebada y la colza de invierno. Al final del otoño, el estadio de crecimiento predominante de los cultivos de cereales de invierno es la tercera hoja. Parte de las parcelas de trigo, principalmente en las regiones del noroeste (estaciones agrometeorológicas de Băzovec, Pavlikeni), se encuentran en la etapa de emergencia y desarrollo foliar temprano (1-2 hojas). El trigo en las regiones orientales del país se encuentra en la etapa de macollaje, en la que los cereales de invierno invernán con éxito. En la colza, como consecuencia del déficit de humedad durante la vegetación otoñal, solo parte de las parcelas se encuentran en la etapa de roseta, la etapa apropiada para la invernada.

En diciembre, las temperaturas mínimas previstas de hasta -11°C, en condiciones sin cobertura de nieve y con una persistencia más prolongada, serán críticas para los cultivos de cereales de invierno en la etapa de emergencia y desarrollo foliar temprano, y para las parcelas de colza que no han logrado formar una roseta.

Tras las precipitaciones significativas durante el tercer período decenal de noviembre, que superaron los 50-60 mm en muchos lugares del sur de Bulgaria (Sandanski, Pazardzhik, Plovdiv, Haskovo, Kardzhali, Chirpan), se produjo un aumento sustancial de las reservas de humedad en las capas superiores del suelo y, en la mayoría de las regiones cultivables del país, se ha superado el déficit de humedad en los cultivos sembrados en otoño. Las precipitaciones previstas en diciembre, en torno a la norma mensual, aumentarán aún más las reservas de humedad del suelo en la capa de 100 cm.