

'Período con condiciones adecuadas para la siembra preinvernal de cultivos de hortalizas resistentes al frío'

Автор(и): Растителна защита

Дата: 15.12.2019 Брой: 12/2019



Durante la segunda decena de diciembre, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por un tiempo suave para la temporada. En las zonas de campo del país, se pronostican temperaturas mínimas positivas, así como valores medios diarios alrededor y por encima del mínimo biológico requerido para la reanudación de los procesos vegetativos en los cultivos de cereales de invierno. Las condiciones para una vegetación retrasada en el trigo y la cebada ocurrirán principalmente en las regiones del sur y a lo largo de la costa del Mar Negro. Al final de la segunda decena, la etapa de crecimiento de la tercera hoja predominará en los cultivos de cereales de invierno. Las siembras realizadas en noviembre no están bien establecidas y se

encuentran en las etapas de emergencia y formación inicial de hojas. El trigo en la etapa de ahijamiento, que es un requisito previo para una invernada exitosa, se encuentra en parte de las regiones orientales (Glavinitsa, Silistra, Tsarev Brod, D. Chiflik, Karnobat) y en lugares de la Llanura Danubiana (Novachene).

Como resultado de la prolongada sequía otoñal, las siembras de trigo tienen una densidad desigual. Varía de 350 a 550–600 plantas por metro cuadrado.

En la colza, solo parte de las siembras formó una roseta durante su vegetación otoñal, una etapa de crecimiento en la que las plantas invernan con éxito.

No se pronostican precipitaciones significativas durante el período, y en muchos lugares de las zonas de campo las condiciones permitirán realizar el arado profundo de las áreas designadas para cultivos de primavera. En las regiones del sur, el próximo período es adecuado para llevar a cabo la siembra preinvernal de algunos cultivos de hortalizas tolerantes al frío: guisantes, habas, zanahorias y otros.

Fuente: NIMH