

Recibimos enero con temperaturas mínimas muy bajas

Автор(и): Растителна защита
Дата: 01.01.2020 Брой: 1/2020



Las temperaturas mínimas previstas durante el mes, de hasta -15°C, en condiciones sin cubierta de nieve y con una persistencia más prolongada, serán críticas para los cultivos de cereales de invierno que no lograron entrar en la etapa de ahijamiento durante su vegetación otoñal. Estos valores también serán críticos para las parcelas subdesarrolladas de colza de invierno que, como resultado de la sequía otoñal, no formaron una roseta (de 7-8 hojas) – la etapa en la que las plantas invernán con éxito.

Las altas temperaturas de diciembre prolongaron la vegetación de los cultivos sembrados en otoño. Como resultado de las temperaturas superiores a lo normal, algunos de los cultivos de cereales de invierno que

emergieron tarde en el oeste de Bulgaria, en las estaciones agrometeorológicas de Kneja, Sofía y Kyustendil, formaron 2-3 hojas.

En enero, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por temperaturas alrededor y por encima de las normas climáticas, lo que mantendrá a los cultivos sembrados en otoño y a las plantaciones perennes en estado de latencia. Los cultivos de cereales de invierno entrarán en el mes más frío del año en diferentes etapas fenológicas – una consecuencia de la prolongada sequía otoñal y de la siembra tardía. Una parte significativa de las parcelas invernarán en la etapa de tres hojas. En la etapa de ahijamiento, la etapa apropiada para la invernada, se encuentra una gran parte de las parcelas de trigo en el este de Bulgaria, en Silistra, Glavinitsa, Tsarev Brod, Dolni Chiflik, Yambol y Karnobat. Debilitados, en las etapas de emergencia y formación inicial de hojas, se encuentran algunos de los cultivos de cereales de invierno sembrados tardíamente (sembrados en noviembre) en lugares de la Llanura Danubiana, en las estaciones agrometeorológicas de Nikolaevo y Pavlikeni.

Las temperaturas mínimas previstas durante el mes, de hasta -15°C, en condiciones sin cubierta de nieve y con una persistencia más prolongada, serán críticas para los cultivos de cereales de invierno que no lograron entrar en la etapa de ahijamiento durante su vegetación otoñal. Estos valores también serán críticos para las parcelas subdesarrolladas de colza de invierno que, como resultado de la sequía otoñal, no formaron una roseta (de 7-8 hojas) – la etapa en la que las plantas invernan con éxito.

Las precipitaciones esperadas en enero, alrededor y por debajo de la norma, aumentarán las reservas de humedad del suelo en las capas de 50 cm y 100 cm. Al comienzo del invierno, en la mayor parte del país, el nivel de reservas de humedad en la capa de un metro de suelo es inusualmente bajo para la temporada. En lugares del oeste de Bulgaria, en las estaciones agrometeorológicas de Kneja y Kyustendil, y en algunas de las regiones orientales, en las estaciones agrometeorológicas de Razgrad y Sliven, está por debajo del 65% de la capacidad de campo (CC).

En enero, se presentarán condiciones más adecuadas para llevar a cabo la poda de invierno en viñedos y huertos durante la segunda mitad del mes.

Fuente: NIMH

