

Previsión agrometeorológica para mediados de enero

Автор(и): Растителна защита
Дата: 13.01.2020 Брой: 1/2020



El tiempo relativamente seco previsto durante el período será adecuado para realizar labores profundas de arado y cultivaciones entre líneas en viñedos y huertos, que destruyen una gran parte de las fases de invernada de numerosas plagas (gorgojos, polillas, moscas de sierra de la fruta, etc.). Las temperaturas diurnas positivas pronosticadas permitirán la implementación de pulverizaciones de protección invernal de plantas en huertos.

A principios de enero, en algunas localidades del oeste de Bulgaria (Vidin, Knezha, Dragoman, Sofía, Kyustendil) y en la llanura de Tracia (Plovdiv, Chirpan), se registraron temperaturas mínimas de alrededor de menos 10-11°C. Estos valores, en condiciones sin capa de nieve y con una persistencia más prolongada, son

peligrosos para los cultivos de invierno sembrados tardíamente que pasan el invierno en las etapas de emergencia y desarrollo foliar inicial.

Tras el breve período de frío, durante el siguiente período las condiciones agrometeorológicas sufrirán un cambio. Se pronostican temperaturas por encima de lo normal hasta mediados de enero, pero sus valores medios diarios se mantendrán por debajo del mínimo biológico requerido para la reanudación de los procesos vegetativos en los cultivos de cereales de invierno, y las plantas permanecerán en estado de latencia.

No se pronostican precipitaciones significativas durante el período, y el nivel de reservas de humedad del suelo en los cultivos de cereales de invierno en las capas de 50 y 100 cm se mantendrá inusualmente bajo para la temporada – en algunas regiones orientales por debajo del 60% de la capacidad de campo. Al comienzo del invierno, en años sin sequía otoñal, las reservas de humedad del suelo en la capa de 100 cm suelen alcanzar niveles cercanos a la capacidad de campo.

El tiempo relativamente seco previsto durante el período será adecuado para realizar labores profundas de arado y cultivaciones entre líneas en viñedos y huertos, que destruyen una gran parte de las fases de invernada de numerosas plagas (gorgojos, polillas, moscas de sierra de la fruta, etc.). Las temperaturas diurnas positivas pronosticadas permitirán la implementación de pulverizaciones de protección invernal de plantas en huertos.

Fuente: NIMH