

Pronóstico agrometeorológico para finales de enero y principios de febrero

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.02.2020 Брой: 2/2020



Durante el período, como resultado de las temperaturas superiores a lo normal, los cultivos de otoño en las áreas de campo pasarán de una latencia profunda a una latencia relativa. En lugares de la Llanura Danubiana y en las regiones orientales, donde se pronostican temperaturas máximas de hasta 14-15°C, las temperaturas medias diarias alcanzarán y superarán el mínimo biológico requerido para la reanudación de los procesos vegetativos en los cultivos de cereales de invierno. Estas temperaturas superiores a lo normal afectarán principalmente a las siembras atrasadas en las etapas de emergencia y de 1-2 hojas. Una parte significativa del trigo cesó su vegetación otoñal en las etapas de tercera hoja y ahijamiento.

Las precipitaciones esperadas durante el próximo período no tendrán significación económica y las reservas de humedad del suelo para los cultivos de otoño en las áreas de campo permanecerán inusualmente bajas para la temporada. A finales de la segunda decena de enero, en algunas regiones orientales (Razgrad, Sliven) el nivel de reservas de humedad en las capas de 50 y 100 cm estaba por debajo del 60% de la capacidad de campo.

A principios de febrero, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por un tiempo cálido para la temporada. Hacia mediados de la primera decena de febrero, se pronostican temperaturas máximas de alrededor de 18-20°C en muchas partes del país, y temperaturas medias diarias de 4-5°C por encima del mínimo biológico requerido para la vegetación de los cultivos de cereales de invierno. Bajo estas altas temperaturas, inusuales para la temporada, en gran parte de las áreas de campo el factor limitante para la reanudación de los procesos vegetativos en los cultivos sembrados en otoño será el déficit de humedad en las capas superiores del suelo, como resultado de las escasas precipitaciones de enero, que, con pocas excepciones, están por debajo de los 10 l/m². Debido a la falta de humedad, se observa un amarillamiento parcial de las siembras de trigo en algunas áreas de campo.

A finales de la semana actual, se espera un cambio significativo en las condiciones agrometeorológicas. La pronunciada caída de temperaturas pronosticada dificultará la prematura hinchazón de yemas iniciada en algunos árboles frutales de floración temprana. Se esperan precipitaciones de lluvia y nieve, así como una mejora en las condiciones para la invernada de los cultivos agrícolas.

En la mayoría de los días del período, las condiciones permitirán la realización de la poda en viñedos y huertos. En los cultivos frutales, junto con la poda de aclareo y acortamiento, también se realiza la poda fitosanitaria: se destruyen ramas y brotes momificados, secos e infestados por enfermedades. Al realizar la poda fitosanitaria, los cortes deben hacerse a una distancia de 30-40 cm de la zona dañada, y las herramientas deben desinfectarse después de cada corte.

Fuente: NIMH