

Clima dinámico con precipitaciones frecuentes en marzo

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.03.2020 Брой: 3/2020



Las temperaturas estacionales por encima de lo normal durante la segunda quincena de febrero reanudaron la vegetación de una gran parte de los cultivos agrícolas invernantes.

Durante el primer decenio de marzo, las condiciones agrometeorológicas volverán a estar determinadas por temperaturas superiores a las normales. El tiempo cálido previsto a principios de mes, con temperaturas máximas de hasta 18-19°C, activará los procesos vegetativos en los cultivos de otoño y en los frutales de las regiones bajas del país. Las precipitaciones previstas durante el decenio mejorarán las reservas de humedad del suelo en la capa de cincuenta centímetros y las condiciones para el desarrollo de los cereales de invierno y

la colza de invierno. Durante este período, una parte importante de las parcelas de trigo, que han invernado en la fase de tres hojas, entrarán en la fase de ahijamiento. En la colza, predominará la fase de roseta.

Durante el segundo decenio, las temperaturas previstas, en torno y ligeramente por debajo de las normas climáticas, limitarán el desarrollo de los cultivos agrícolas. En algunos lugares del norte de Bulgaria y en las regiones occidentales, donde no se descartan precipitaciones en forma de nieve, se observará un debilitamiento y un cese temporal de la vegetación en los cultivos de otoño. En el resto de las regiones del país, los valores de las temperaturas medias diarias estarán próximos al mínimo biológico requerido para el desarrollo de los cereales de invierno y la colza de invierno.

Durante el tercer decenio de marzo, se espera una mejora de las condiciones térmicas y una activación de los procesos vegetativos en los cultivos de otoño. A finales de mes, predominará la fase de ahijamiento en el trigo. En los cereales de invierno sembrados dentro del período agrotécnico óptimo, se observará un aumento del coeficiente de ahijamiento.

En marzo, se producirán las siguientes fases fenológicas en los frutales: hinchazón y apertura de las yemas de fruto, y a finales del tercer decenio, en las especies de hueso (almendro, albaricoquero, melocotonero) de las regiones bajas, se observará la formación de botones florales y la floración. Las temperaturas mínimas previstas durante el mes, de hasta menos 8°C, supondrán un riesgo para los frutales que estén más avanzados en su desarrollo y hayan entrado en las fases de formación de botones florales y floración.

Las precipitaciones de febrero, tras la prolongada sequía invernal, contribuyeron a superar el déficit de humedad en los cereales de invierno en las capas superiores del suelo. Las precipitaciones previstas en marzo, en torno y por encima de la norma, aumentarán las reservas de humedad del suelo en la capa de un metro.

Durante la mayor parte de los días de marzo, el tiempo dinámico previsto, con frecuentes precipitaciones, dificultará la realización de algunas actividades agrotécnicas estacionales. Las condiciones más favorables para llevar a cabo los tratamientos fitosanitarios prefloración en los frutales, y para la labranza previa a la siembra de las superficies destinadas a los cultivos de primavera tempranos y medio-tempranos, se darán a principios de mes y durante la mayor parte de los días del tercer decenio. A mediados de marzo, comienza la ventana agrotécnica (15-20.03) para la siembra de girasol en el sur de Bulgaria, y a mediados del tercer decenio (25.03–5.04) – en la llanura del Danubio.

Fuente: NIMH