

# 'Actividades de protección vegetal difíciles a mediados de marzo'

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 19.03.2020 Брой: 3/2020



A principios de marzo, cayeron precipitaciones de entre 20 y 40 l/m<sup>2</sup> en el oeste y centro de Bulgaria, lo que provocó un aumento de las reservas de humedad del suelo en la capa de 50 cm y 100 cm en los cultivos agrícolas.

A mediados de marzo, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por temperaturas medias diarias en torno y por encima del mínimo biológico de los cultivos agrícolas invernantes. Sus procesos de vegetación proseguirán a un ritmo normal. Las precipitaciones previstas durante la primera mitad del periodo, nuevamente más significativas en cantidad en el suroeste y centro de Bulgaria, favorecerán el aumento de las reservas de humedad en la capa de un metro del suelo.

Durante el periodo, el trigo se encontrará en la fase de macollaje masivo y se observará un aumento del coeficiente de macollaje. En la colza se producirá el ramificado. En las especies frutales tendrán lugar la hinchazón de yemas y el brote, y en algunos frutales de hueso (melocotonero, albaricoquero) del centro y este de Bulgaria, también se producirá la fase de floración. Durante el periodo, comienza el plazo agrotécnico para la siembra de girasol en el sur de Bulgaria.

Las precipitaciones previstas en muchos lugares de las zonas de campo dificultarán la realización de labores de labranza de calidad y la ejecución de actividades de protección vegetal.

*Fuente NIMH*