

'Aumento significativo de las temperaturas a principios de abril'

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.04.2020 Брой: 4/2020



Tras los inusuales fenómenos meteorológicos invernales a finales de marzo y principios de abril, que causaron daños adicionales a los cultivos frutales avanzados en su desarrollo, durante el próximo período de siete días las condiciones agrometeorológicas experimentarán un cambio significativo.

Se pronostica un aumento de las temperaturas para los primeros días del período. En las zonas de campo, sus valores medios diarios alcanzarán y superarán el mínimo biológico requerido para la vegetación de los cultivos de cereales de invierno y la colza.

Se pronostica una normalización de las condiciones de temperatura y una activación de los procesos vegetativos en las parcelas sembradas en otoño y en los cultivos de primavera sembrados hacia el final del período. Al final de la primera decena de abril, se observarán las siguientes etapas en el trigo y la cebada: ahijamiento, transición al alargamiento del tallo y fase de alargamiento del tallo, principalmente en las parcelas de partes de la Llanura Danubiana y en las regiones orientales del país (estaciones agrometeorológicas: Novachene, Silistra, Tsarev Brod, Razgrad, D. Chiflik, Karnobat). En la colza de invierno se observará el inicio de la fase de formación de yemas.

Para el final de la primera decena de abril, en muchos lugares de las regiones de campo, el alto contenido de humedad en las capas superiores del suelo, como resultado de las precipitaciones significativas al inicio de la primavera, dificultará la realización de la labranza previa a la siembra y la siembra de cultivos de primavera de media estación. Por esta razón, se esperan retrasos en la siembra de girasol. El plazo agrotécnico para la siembra de girasol en la Llanura Danubiana es hasta mediados de la primera decena de abril, y hasta el final de la decena, en el noreste de Bulgaria, en las zonas costeras y en los campos altos del suroeste de Bulgaria.

Condiciones favorables para realizar fumigaciones de protección vegetal en cultivos frutales no afectados por las heladas primaverales ocurrirán durante la segunda mitad del período.

Fuente NIMH