

Ескарabajo velludo – *Epicometis hirta*

Автор(и): Растителна защита
Дата: 30.04.2020 Брой: 4/2020



Descripción de la plaga

El escarabajo peludo es una plaga ampliamente distribuida en los cultivos frutales de Bulgaria. Destruye completamente las flores atacadas al roer todos los órganos florales (pétalos, estambres, pistilo). Además, roe los botones florales sin abrir, los brotes jóvenes y las hojas tiernas. Entre los cultivos frutales, ataca y daña con mayor severidad al membrillo, peral, manzano y, con menos frecuencia, al ciruelo, guindo, melocotonero y fresa. Además de estos, ataca a los frutos pequeños, la vid, las crucíferas, los cereales, las leguminosas, algunas plantas de las familias Chenopodiaceae y Apiaceae, etc.

Daños:

La plaga desarrolla una generación por año e inverna como insecto adulto en el suelo. Los escarabajos se activan a principios de la primavera y causan daños durante la floración, atacando a todas las especies frutales en flor. Son activos en clima soleado, mientras que en tiempo fresco y frío se esconden bajo los terrones de tierra o permanecen inmóviles en las plantas.

En primaveras secas y cálidas, los daños causados por el escarabajo son significativos. Los adultos se alimentan de las flores, royendo los pistilos, estambres y pétalos.

Las flores se vuelven amarillas y parecen como si hubieran sufrido daños por heladas. El escarabajo también roe hoyos en los frutos jóvenes, especialmente en la cereza, que se deforman.

Control:

El escarabajo peludo aparece durante el período de floración de los cultivos frutales, y el uso de productos fitosanitarios está muy restringido.

En áreas pequeñas, se aplica la recolección manual en las horas de la mañana y la destrucción de los escarabajos, después de sacudir las ramas o los árboles enteros.

Las medidas de control se implementan con un umbral económico de daño de 3-5 individuos/100 rosetas, o un 5% de inflorescencias dañadas. El control químico del escarabajo peludo es difícil, primero porque se lleva a cabo durante la floración y la mayoría de los productos fitosanitarios son perjudiciales para las abejas, y segundo porque la cubierta corporal del escarabajo proporciona una muy buena protección contra los pesticidas.

Insecticidas registrados para el control: Vaztak Nov 100 EC – 10 ml/da (en colza).