

La marta puede causar daños graves a los frutos del cerezo.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.05.2020 Брой: 5/2020



El escarabajo de la rosa – *Cetonia aurata* L. está ampliamente distribuido por todo el país. Daña los frutales, con preferencia por el cerezo y el peral. También se encuentra en la vid, la rosa y el escaramujo. Además, se ha comprobado que causa daños en el maíz y la col. Aparece con mayor frecuencia en las flores del escaramujo y la rosa. También se alimenta de las partes florales de la manzanilla, el cilantro y la milenrama.

En los últimos años, el escarabajo de la rosa se ha observado en algunas plantaciones de cerezos y jardines domésticos de la región de Kyustendil. Su densidad de población es mayor en zonas con malezas y en arbustos de escaramujo y huertos de cerezos descuidados. En árboles individuales se han registrado hasta 80 – 100 escarabajos.

El insecto adulto es un escarabajo relativamente grande. La longitud del cuerpo es de hasta 2 cm. El pronoto y los élitros son de un verde intenso con un brillo metálico dorado. La parte ventral es de color rojo cobrizo. Hay rayas transversales blancas en los élitros.

El escarabajo de la rosa tiene una generación por año. Los escarabajos pasan el invierno en el suelo. En primavera aparecen durante la floración de los frutales. Los escarabajos están activos y vuelan alrededor del mediodía, cuando hace más calor. Roen los estambres y el pistilo de las flores y dañan las hojas y los frutos.

En los frutos de cerezo infestados, roen heridas profundas y en la mayoría de los casos los destruyen por completo. Hemos registrado un 80% de frutos dañados en un solo árbol.

Daños

Las hembras fecundadas ponen sus huevos en madera podrida y en suelo rico en madera descompuesta. Las larvas se desarrollan en este entorno de descomposición y pupan el mismo año.

El control químico contra el escarabajo de la rosa debe dirigirse al estado adulto, que es el que causa el daño principal. Hasta ahora no se han probado insecticidas contra esta plaga porque no ocurría con frecuencia. El control también se complica por el hecho de que la pulverización debe realizarse en el momento de la maduración de la fruta y deben observarse los períodos de carencia.

Control

El escarabajo de la rosa pertenece a la familia de los escarabeidos, que también incluye al abejorro peludo. Se recomienda utilizar insecticidas con un corto intervalo pre-cosecha, que estén aprobados contra el abejorro peludo: Vaztak Nov 100 EC – 10 ml/da. También se pueden utilizar trampas de color azul claro o blanco con atrayente. Para reducir los daños causados por el escarabajo de la rosa, también es necesaria una buena práctica agronómica: labranza regular, fertilización, recolección, eliminación y destrucción de la vegetación de malezas, arbustos de escaramujo y residuos vegetales en descomposición, donde se desarrollan las larvas de la plaga.