

Lluvias y mayor riesgo de granizo a principios de mayo

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.05.2020 *Брой:* 5/2020



Durante el próximo período de siete días, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por un tiempo inestable y temperaturas diarias promedio cercanas a las normas climáticas para la primera decena de mayo. Se pronostican precipitaciones generalizadas durante el período, junto con una mejora en las condiciones para la vegetación de los cultivos sembrados en otoño y los cultivos de primavera ya sembrados. Tras la intensificación de la sequía primaveral en las regiones del noreste, las precipitaciones esperadas brindarán una oportunidad para la recuperación de parte de los cultivos de cereales de invierno que se encuentran en estado crítico. El déficit de humedad del suelo en muchos lugares del noreste de Bulgaria ha sido un factor limitante para el desarrollo del trigo y una causa del amarillamiento en parte de las parcelas.

En las regiones del suroeste y en la mayor parte de la llanura tracia, donde cayeron precipitaciones de importancia económica en abril – en algunos lugares más de 50-60 l/m² (Kyustendil-67 l/m², Blagoevgrad-52 l/m², Sandanski-73 l/m², Pazardzhik-83 l/m², Plovdiv-87 l/m², Haskovo-93 l/m², Stara Zagora-50 l/m², Chirpan-67 l/m²), el estado de los cultivos de cereales de invierno es bueno.

Durante el próximo período, en las zonas de campo, el trigo y la cebada pasarán del alargamiento del tallo al espigado y a la etapa de espigado. Para el maíz y el girasol, dependiendo de las fechas de siembra, se observarán las etapas de emergencia y formación de hojas.

Durante la primera semana de mayo, no se pronostican temperaturas mínimas críticas para los cultivos agrícolas, pero la probabilidad de granizo sigue siendo elevada. En caso de daños por granizo, se recomienda tratar los cultivos afectados en la primera oportunidad con fungicidas que contengan cobre para reducir el riesgo de infecciones secundarias.

Fuente: NIMH