

Pronóstico agrometeorológico para el mes (

Автор(и): Растителна защита
Дата: 17.05.2020 Брой: 5/2020



Durante la primera decena de mayo, el desarrollo de los cultivos agrícolas procederá a un ritmo moderado, con temperaturas medias diarias cercanas a las normas climáticas. A principios de mayo, las precipitaciones previstas serán decisivas para la supervivencia de parte de los cultivos de cereales de invierno en el noreste de Bulgaria. A finales de abril, en muchos lugares de las regiones del noreste, el nivel de reservas de humedad del suelo para el trigo en las capas de 50 cm y 100 cm era inusualmente bajo para la temporada, por debajo del 55-60% de la capacidad de campo, como resultado de precipitaciones por debajo de lo normal durante la primera mitad de la primavera. Por esta razón, parte de las parcelas de trigo se encuentran en estado crítico. En las estaciones agrometeorológicas de Silistra y Tsarev Brod se han registrado daños y amarillamiento de la masa foliar (hasta un 50-60%) en el trigo, como consecuencia del déficit de humedad del suelo.

Durante la primera decena de mayo, se observará la etapa de espigado en el trigo y la cebada en las regiones de campo.

A finales de la primera y durante la segunda decena, se pronostica un aumento de las temperaturas y una aceleración de la vegetación en los cultivos de cereales de invierno y en los cultivos de primavera sembrados. Durante este período, tendrán lugar la floración, la fertilización y la formación del grano en el trigo.

Durante la tercera decena, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por un tiempo inestable y fresco para el período. Las precipitaciones significativas previstas serán de excepcional importancia para los cultivos de cereales de invierno, en los que estará en progreso el llenado del grano. A finales de mayo, parte de las parcelas de cebada y trigo en lugares de las regiones del sur entrarán en la etapa de madurez lechosa.

Durante el mes, tendrá lugar la formación de hojas en el maíz y el girasol. Al final de la tercera decena, en el girasol sembrado dentro del plazo agrotécnico, se observará la formación de la inflorescencia.

En los cultivos frutales, ocurrirá la formación y el agrandamiento del cuajado de frutos. En la vid, se observará la separación de las inflorescencias y, a finales del mes, también la etapa de floración.

Las precipitaciones frecuentes en mayo crearán condiciones favorables para el desarrollo de una serie de enfermedades fúngicas: mildius en vides y cultivos hortícolas; sarna en especies de fruta de pepita, podredumbre parda temprana y cribado en árboles de fruta de hueso; royas (amarilla, parda) y fusariosis de la espiga en cultivos de cereales de invierno.

Condiciones más adecuadas para llevar a cabo pulverizaciones de protección vegetal ocurrirán durante la segunda mitad de la primera y en la mayoría de los días de la segunda decena.

En mayo, no se pronostican temperaturas mínimas críticas para los cultivos agrícolas, pero la probabilidad de granizo permanece elevada. En caso de daños por granizo, es aconsejable que los cultivos afectados sean tratados en la primera oportunidad con fungicidas que contengan cobre para una curación más rápida de las heridas y para reducir el riesgo de infecciones secundarias.