

Jueves, 23 de mayo de 2024

Tiempo inestable y fresco para la temporada

El tiempo inestable y fresco para la temporada continuará hoy, con cielos mayormente nublados y chubascos ocasionales, principalmente en las regiones del norte y del este. Las temperaturas máximas serán de 17 a 22 grados.

Por la noche, los chubascos cesarán y las nubes se dispersarán gradualmente. Las temperaturas mínimas serán de 8 a 13 grados.

El viernes estará mayormente soleado. Las temperaturas máximas serán de 21 a 26 grados.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 31.05.2020 *Брой:* 5/2020



A finales de mayo y principios de junio, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por un tiempo inestable y fresco para la temporada. Se pronostican precipitaciones significativas en muchas partes del

país, mejorando las reservas de humedad en las capas superiores del suelo y las condiciones para la vegetación de los cultivos de primavera. Las precipitaciones esperadas a finales de mayo y principios de junio resultarán demasiado tardías para parte de los sembrados de trigo en algunas zonas del este de Bulgaria (Provadia, Shabla, D. Chiflik, Karnobat), donde las etapas de espigado, floración, fertilización y formación del grano ocurrieron bajo un déficit de humedad del suelo en aumento. En algunas regiones orientales, los sembrados de trigo que se han amarilleado prematuramente, con espigas poco granadas, no serán cosechados.

Durante el período siguiente, en los campos altos, los cultivos de cereales de invierno estarán en la etapa de llenado del grano. En las regiones de tierras bajas, el trigo estará en la etapa de madurez lechosa. La cebada estará en la etapa de madurez lechosa y, al final del período, comenzará la transición a la madurez cerosa. La colza estará en la etapa de maduración. Durante el período, el maíz y el girasol estarán en la etapa de formación de hojas. En el girasol sembrado dentro del marco de tiempo agrotécnico, se observará la formación de la inflorescencia.

El tiempo fresco pronosticado con precipitaciones frecuentes durante el período creará condiciones para un aumento de la presión de infección de algunos patógenos fúngicos – mildiu en viñedos y cultivos hortícolas, podredumbre parda tardía en cultivares tardíos de cerezo, sarna en especies de frutas de pepita, etc. A principios de junio, no se debe subestimar el control de una de las plagas más peligrosas en huertos – la polilla de la manzana. Las condiciones para realizar pulverizaciones de protección vegetal estarán presentes a mediados de la primera decena de junio.

Fuente: NIMH