

Pronóstico agrometeorológico para el mes de junio

Автор(и): Растителна защита
Дата: 10.06.2020 Брой: 6/2020



Durante la mayor parte de los días de la primera y segunda decena de junio, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por tiempo inestable. A principios de mes, el desarrollo de los cultivos agrícolas procederá a un ritmo más lento, con temperaturas por debajo de lo normal. Hasta mediados de la primera decena, se pronostican precipitaciones en muchas partes del país, mejorando las reservas de humedad del suelo en la capa de 50 cm y las condiciones para la vegetación de los cultivos de primavera. Las lluvias de finales de mayo y las esperadas a principios de junio resultaron ser demasiado tardías para los cultivos sembrados en otoño en muchos lugares del este de Bulgaria, donde las fases reproductivas de su desarrollo ocurrieron bajo un déficit creciente de humedad del suelo. En gran parte de las regiones orientales, se pronostican rendimientos severamente reducidos, y en algunos lugares los cultivos prematuramente amarillentos, con espigas mal granadas, no serán cosechados.

Después del tiempo más fresco de lo habitual para la temporada durante la segunda mitad de la primera decena, se pronostica una mejora en las condiciones térmicas. Durante la decena, en los cultivos de cereales de invierno en los campos altos, tendrá lugar el llenado del grano. En las zonas de tierras bajas, el trigo estará en la etapa de madurez lechosa, y hacia el final de la decena, en algunos lugares, también se observará el comienzo de la etapa de madurez cerosa. *Durante el período interfásico desde el llenado del grano hasta la madurez lechosa, las larvas del chinche del trigo causan graves daños al trigo. Durante este período, los cultivos de trigo deben ser monitoreados para detectar la presencia de la plaga, y si su densidad supera el umbral económico de daño, es necesario un tratamiento oportuno.*

A principios de la segunda decena, en las zonas de tierras bajas, la cebada estará predominantemente en la etapa de madurez cerosa, y la colza estará en la etapa de maduración.

Durante la segunda mitad de junio, el desarrollo de los cultivos agrícolas procederá a un ritmo más rápido. A finales de la segunda y principios de la tercera decena, el trigo estará predominantemente en la etapa de maduración.

Para finales de junio, algunos de los cultivos de primavera entrarán en las fases reproductivas de su desarrollo: en el girasol, se observará el inicio de la floración, y en los híbridos de maíz más tempranos – el espigado y la floración de la espiga.

El tiempo inestable pronosticado en junio, con precipitaciones frecuentes, creará condiciones para el desarrollo de una serie de enfermedades fúngicas: mildius en viñedos y cultivos de hortalizas, sarna en árboles frutales, etc. Durante el mes, la probabilidad de granizadas permanecerá elevada. Después de una granizada, los cultivos de frutas y hortalizas afectados deben tratarse con fungicidas que contengan cobre a la primera oportunidad.

Fuente: NIMH