

Período con condiciones para incrementar el fondo infeccioso de enfermedades fúngicas en cultivos agrícolas

Автор(и): Растителна защита

Дата: 01.07.2020 Брой: 7/2020



A finales de junio y principios de julio, las condiciones agrometeorológicas sufrirán un cambio significativo. Durante los últimos días de junio, no se pronostican precipitaciones en las zonas de campo, lo que brindará la oportunidad de realizar algunos tratamientos fitosanitarios urgentes. El tiempo inestable persistente durante el período pasado creó condiciones para un aumento del fondo infeccioso de una serie de enfermedades fúngicas: sarna, cribado y podredumbre parda tardía en frutales; mildiu vellosa en viñedos y cultivos hortícolas, etc. En muchas partes del país, las lluvias significativas dificultaron la cosecha del grano maduro. En algunas de las parcelas de trigo encharcadas, ha comenzado el ennegrecimiento de las espigas, lo que supone un riesgo de deterioro de la calidad del grano.

Durante el período siguiente, el desarrollo de los cultivos de primavera procederá a un ritmo acelerado, con temperaturas alrededor y por encima de las normas climáticas para el comienzo del verano y con reservas de humedad de buenas a muy buenas en las capas superiores del suelo. En la mayoría de las partes del país, con la excepción del extremo noroeste (estación agrometeorológica de Buzovets) y las regiones del suroeste (estación agrometeorológica de Sandanski), las reservas de humedad del suelo en la capa de 50 cm se encuentran en niveles superiores al 75-80% de la capacidad de campo. Durante el período, el girasol estará en las etapas de formación de la inflorescencia y floración, principalmente en los cultivos de las regiones del sur. En los híbridos de maíz temprano, se observarán las etapas de espigado y floración de la espiga, mientras que en los híbridos más tardíos – formación de hojas. A finales de junio y principios de julio, se deben inspeccionar los campos de maíz para detectar la presencia de una de las plagas más importantes – el taladro del maíz, y cuando su densidad supere el nivel de daño económico (10 puestas de huevos por cada 100 plantas), es necesario un tratamiento (contra las larvas jóvenes antes de que penetren en los tallos).

A principios de julio, se pronostican nuevamente precipitaciones y las condiciones para llevar a cabo la actividad más importante – la cosecha de trigo – se deteriorarán.

Fuente: NIMH