

Pronóstico agrometeorológico para julio

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.07.2020 *Брой:* 7/2020



Durante la primera mitad de la primera decena de julio, el desarrollo de los cultivos agrícolas se producirá en condiciones térmicas por encima de lo normal. A principios de mes, en la mayor parte del país, a excepción de las regiones extremas del noroeste (estación agrometeorológica de Buzovets) y del suroeste (estación agrometeorológica de Sandanski), la vegetación de los cultivos de primavera tendrá lugar en condiciones de buenas reservas de humedad del suelo en las capas de 50 cm y 100 cm (más del 75-80% de la capacidad de campo) – como resultado de las precipitaciones significativas y superiores a lo normal de junio, que en algunos lugares superaron los 90-100 l/m² (Montana – 96 l/m², Veliko Tarnovo – 133 l/m², Ruse – 90 l/m², Silistra – 136 l/m², Dobrich – 105 l/m², Varna – 103 l/m², Kazanlak – 104 l/m², Haskovo – 92 l/m², Kardzhali – 173 l/m², Stara Zagora – 115 l/m²).

Durante la primera decena, dependiendo de la precocidad de los híbridos de maíz, se presentarán varias fases: formación de hojas, espigado, floración de la espiga y emisión de los estigmas. En el girasol, en las zonas de campo predominará la fase de floración, mientras que en los cultivos de las tierras altas – la formación de la inflorescencia. En las leguminosas grano (judías, soja), se observará la formación de vainas.

Durante la segunda y el inicio de la tercera decena, el desarrollo de los cultivos agrícolas proseguirá a un ritmo moderado, con temperaturas en torno y ligeramente por debajo de lo normal para el período. Las frecuentes precipitaciones previstas durante este periodo tendrán un efecto beneficioso sobre los cultivos de primavera que se encuentran en la etapa reproductiva de su desarrollo, cuando la demanda de agua aumenta bruscamente (en el maíz, durante el período desde el espigado hasta la madurez lechosa, el consumo diario de agua alcanza los 6-7 m³/décare). A principios de la tercera decena de julio, parte de los híbridos tempranos de maíz en las zonas de campo entrarán en la etapa de madurez lechosa. En el girasol, tendrá lugar la formación y llenado de la semilla. A finales de mes, en los cultivos sembrados dentro del plazo agrotécnico, en algunos lugares de la Llanura Danubiana y en las regiones del sur, se observará el inicio de la fase de maduración.

Durante la última semana de julio, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por un tiempo relativamente seco, cálido y caluroso, lo que hará necesario aplicar un régimen de riego apropiado para los híbridos tardíos de maíz y los cultivos hortícolas de producción tardía de campo. Las condiciones meteorológicas durante este periodo limitarán el desarrollo de una serie de enfermedades fúngicas, con la excepción de los oídios en los cultivos hortícolas y frutales, y el oídio en la vid.

En julio, no se debe subestimar la pulverización de protección vegetal en los cultivos frutales contra la segunda generación de carpocapsas, pulgones y ácaros. Las condiciones más adecuadas para realizar los tratamientos de protección vegetal se presentarán en la mayoría de los días de la primera y tercera decena, durante las horas más frescas del día.

Durante los períodos más calurosos de julio, con temperaturas máximas de hasta 38-39°C, aumentará el riesgo de incendios durante la cosecha de cereales.

Fuente: NIMH