

Protección vegetal en melocotonero y albaricoquero a finales de junio y principios de julio

Автор(и): проф. Мария Боровинова

Дата: 07.07.2020 Брой: 7/2020



En el **melocotonero**, continúan los tratamientos contra el oídio, cribado, monilia, Anarsia, polilla oriental y pulgones.

Para el oídio, se utiliza uno de los siguientes fungicidas: Difkor 250 EC – 20 ml/da, Embrelia – 150 ml/da, Indar 5 EW – 150 ml/da, Karamat 2.5 EW – 300 ml/da, Kozavet DF – 150 g/da, Kumulus DF – 750 g/da, Luna Experience – 50 ml/da, Miklofil – 32-60 ml/da, Password 25 WG – 50 g/da, Ritual – 32-60 ml/da, Sercadis – 15 ml/da, Signum WG – 45 g/da, Systhane 20 EW – 15-36 ml/da, Systhane EcoZome EW – 65-200 ml/da, Score

250 EC – 20-30 ml/da, Solfo 80 WG – 750 g/da, Sulgran – 500 g/da, Sulphur WG – 600 g/da, Thiovit Jet 80 WG – 600 g/da, Topaz 100 EC – 50 ml/da, Flosul SC – 500 ml/da, Fontelis SC – 120 ml/da, Heliosulfur C – 125-500 ml/da, Hercules 120 SC – 15-25 ml/da. De los fungicidas enumerados, Indar 5 EW – 150 ml/da, Karamat 2.5 EW – 300 ml/da, Luna Experience – 50 ml/da, Password 25 WG – 50 g/da, Signum – 45 g/da, Systhane 20 EW – 15-36 ml/da, Systhane EcoZome EW – 65-200 ml/da, Score 250 EC – 20-30 ml/da, Fontelis SC – 120 ml/da también son eficaces contra la monilia y se utilizan para el control simultáneo de ambas enfermedades.

Para la polilla oriental y Anarsia, se utiliza uno de los siguientes insecticidas: Avant 150 EC – 33.3 ml/da, Affirm Opti – 200-225 g/da, Voliam Targo 063 SC – 75 ml/da, Delegate 250 WG – 30 g/da, Imidan 50 WG – 150 g/da, Coragen 20 SC – 16-30 ml/da, Lamadex Extra – 70 g/da, Meteor – 90 ml/da, Sumi Alpha 5 EC – 0.02%.

Con alta densidad de pulgones, se realiza un tratamiento con: Abanto – 60 ml/da, Ascot WG – 40-80 g/da, Deka EC/Desha EC/Dena EC/Poleci/Decision – 30-50 ml/da, Decis 100 EC – 8.75-12.25 ml/da, Estrela WG/Lamsha WG/Adalam WG/Indulam WG – 40-80 g/da, Calypso 480 SC – 20 ml/da, Lamadex Extra – 40-60 g/da, Movento 100 SC – 0.075-0.1%, Mospilan 20 SG – 25 g/da, Natur Breaker – 75 ml/da, Proteus O-TEC – 0.05% - 0.06%, Teppeki – 14 g/da.

En el **albaricoquero**, se realizan tratamientos dirigidos a monilia, gnomonia, cribado, Anarsia y polilla oriental.

Para la monilia, se utiliza uno de los siguientes fungicidas: Delan 700 WG – 0.05%, Difkor 250 EC – 20 ml/da, Embrelia – 150 ml/da, Indar 5 EW – 150 ml/da, Karamat 2.5 EW – 300 ml/da, Luna Experience – 50 ml/da, Password 25 WG – 50 g/da, Signum WG – 30 g/da, Systhane 20 EW – 12.5-30 ml/da, Chorus 50 WG – 40-50 g/da. De los fungicidas indicados, Delan 700 WG – 0.05%, Karamat 2.5 EW – 300 ml/da y Signum WG – 30 g/da también son eficaces contra la gnomonia. *Para Anarsia y polilla oriental, se utiliza uno de los insecticidas indicados para el melocotonero.*

Para que los tratamientos contra enfermedades y plagas en frutales sean eficaces, deben realizarse de manera oportuna y de alta calidad. Además, es muy importante determinar la necesidad de realizar un tratamiento específico, lo cual está relacionado con un monitoreo concreto para determinar la densidad de la plaga; cuando se superan los umbrales económicos de daño, se debe realizar un tratamiento.